荔枝草 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8D_94_ E6_9E_9D_E8_8D_89_c22_317542.htm 药品名称荔枝草药物别 名雪见草、癞蛤蟆草、青蛙草、皱皮草。 英文名称Common Sage Herb 类别全草类图片来源为唇形科植物荔枝草Svlvia plebeia R.Br.的地上部分。采制夏、秋季花开、穗绿时采收. 晒干或鲜用。植物形态二年生草本,高15~90cm。茎方形, 多分枝,被倒向疏柔毛。根出叶丛生,有柄,叶片长圆形或 披针形,边缘有圆齿,叶面皱折,面丰有腺点,两面有毛; 茎生叶对生。轮伞花序有2~6朵花,组成假总状花序或圆锥 花序;花萼钟形,轮伞花序有2~6朵花,组成假总状花序或 圆锥花序;花萼钟形,外被金黄色腺点及柔毛,分2唇,上唇 顶端具3短尖头,下唇2齿;花冠唇形,淡紫色至蓝紫色,长 约4.5mm,外面有毛,筒内基部有毛环,上唇长圆形;顶端 有凹口,下唇3裂,中裂片宽倒心形;雄蕊2,药隔细长,药 室分离甚远,上端的药室发育,下端的药室发育,下端的药 室不发育。小坚果倒卵圆形,褐色,平滑,有腺点。花期5月 ,果期6~7月。生长地生于山坡、路边、荒地、河边。主产 江苏、浙江、安徽化学成分含原儿茶酸(protocatechuic acid)、4-羟基苯乳酸、高车前甙(homoplantaginin)、尼泊黄酮 甙(nepetrin)、楔叶泽兰素(eupafolin)、粗毛豚草素 (hispidulin)。性味归经性凉,味苦、辛。功用主治清热, 解毒,凉血,利尿。用于咽喉肿痛、支气管炎、肾炎水肿、 痈肿;外治乳腺炎、痔疮肿痛、出血。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com