

羊角拗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_BE_8A_E8_A7_92_E6_8B_97_c22_317580.htm

药品名称羊角拗药物别名羊角扭、断肠草、打破碗花 英文名称Semen Strophanthi Divaricati

类别种子类性状种子纺锤形或狭长披针形，长1~2.7cm，宽2~4mm，一端狭尖，另端钝圆，有扁平的短翼；深棕色，光滑无毛，具细纵纹，隆起的一面有浅色种脊，自尖端芒基向下延伸，达种子长度的2/3或更长，种脊近尖端处有明显突起的种脐。质脆，易折断，断面胚乳与子叶均富油质。气微，味苦。图片来源为夹竹桃科植物羊角

拗*Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook.et Arn. 的种子采制秋季采收成熟果实，剥去果皮，将种子除去冠毛，晒干植物形态竖立或攀援状灌木，高达2m，有白色乳汁。茎、枝棕褐色，密生白色皮孔。叶对生，长椭圆形或椭圆状矩圆形，长4~10cm，宽1.5~5cm。聚伞花序顶生；花萼5裂，内面有腺体；花冠黄色，漏斗状，5裂，裂片先端延长成1长尾带，长达10cm，花冠喉部具10枚舌状鳞片；雄蕊5；心皮2，离生。骨突果叉生。花期3~4月，果期8~9月。生长地生于荒野、坡地、疏林下或灌丛中。主产广东、广西、福建、贵州。化学成分含羊角拗甙（divaricoside）、辛诺甙（sinoside）、D-毒毛旋花子甙*、（D-strophanthin-、）等。性味归经性寒，味苦；有大毒。功用主治强心，消肿，止痒杀虫。用于风湿痛、小儿麻痹后遗症、多发性脓肿、毒蛇咬伤、跌打、骨折。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com