

泡桐七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_B3_A1_E6_A1_90_E4_B8_83_c22_317692.htm

药品名称泡桐七 类别七类草药说明此药为菊科植物深山蟹甲草(*Cacalia profundorum*)的带根状茎全草。因其叶形大，略似泡桐，故得此名。深山蟹甲草为多年生草本。高1.20米。根状茎粗壮，横卧。茎竖立，多有毛。叶宽卵形，或有棱角，基部截形或微心形，下面疏生蛛丝状毛。头状花序较多数，在顶端排成疏圆锥花序；全为管状花，多为黄色。瘦果圆柱形，冠毛白色。分布于红坪、木鱼、大九湖等地。生长于海拔1200-1800米的山坡、路旁。该药具清热解毒、消肿止痛功效。用于疮疖肿痛、头癣、跌打损伤等。注：同属植物白头蟹甲草(*C*

leucocephala)的带根茎全草亦称泡桐七，叶形亦似泡桐叶，其叶下面密生白色茸毛，易于与上种区别。分布于板仓、大九湖、大神农架等地，生长于海拔1850-2800米的山坡、路旁。具有清热解毒、利水消肿功效。葫芦七此药为菊科植物大黄橐吾(*Ligularia duciformis*)的根茎。因其叶形如葫芦，故得此名。大黄橐吾为多年生草本。全株密被短毛。茎竖立。叶肾形或心形，边缘有锯齿，中部叶有扩大而抱茎的宽鞘，上部叶宽鞘状。头状花序，总苞片5个，条形，小花黄色。瘦果，冠毛白毛。7-8月开花，9-10月结果。分布于宋洛等地。生长于海拔1900米的溪沟。该药具有活血散瘀、止痛的功效。用于跌打损伤、瘀伤咳血、月经不调等症。注：同属植物鹿蹄橐吾(*Ligularia hodgsonii*)的根茎亦作葫芦七入药。与上种的区别为：全株无毛。叶片稍宽，边缘锯齿稍钝。头状花序稍大。总苞片8-9枚。果实冠毛红色。9-10月开花，10-11月结果。分布

于神农架林区各地。其根又称南瓜七。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com