

西河柳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_A5_BF_E6_B2_B3_E6_9F_B3_c22_317930.htm

药品名称西河柳药物别名山川柳、三春柳、西湖柳、赤桤柳。英文名称Chinese Tamarisk Twing, 类别全草类性状茎枝呈细圆柱形，直径0.5~1.5mm。表面灰绿色，有多数互生鳞片状小叶。质脆，易折断。稍粗的枝表面红褐色，叶片常脱落而残留突起的叶基，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。图片来源为桤柳科植物桤柳*Tamarix chinensis* Lour.的细嫩枝叶。植物形态落叶灌木或小乔木。枝密生，绿色或带红色，细长，常下垂。叶互生，极小，鳞片状，卵状三角形，顶端渐尖，基部鞘状抱茎，无柄。总状花序集为疏散的圆锥花序；花小，白色至粉红色，苞片三角状；萼片5；花瓣5，花丝较花冠长，花盘10或5裂；子房上位，1室，花柱3。蒴果小。种子先端有丛毛。花期4~9月，果期8~10月。生长地落叶灌木或小乔木。枝密生，绿色或带红色，细长，常下垂。叶互生，极小，鳞片状，卵状三角形，顶端渐尖，基部鞘状抱茎，无柄。总状花序集为疏散的圆锥花序；花小，白色至粉红色，苞片三角状；萼片5；花瓣5，花丝较花冠长，花盘10或5裂；子房上位，1室，花柱3。蒴果小。种子先端有丛毛。花期4~9月，果期8~10月。化学成分含树脂、槲皮素-甲醚

(quercetin-monomethylether)鞣质、水杨甙(salicin)。性味归经性平，味甘、辛。功用主治散风，解毒，透疹。用于麻疹不透、风湿痹痛。附注同属植物华北桤柳*T.juniperina* Bge.及五蕊桤柳*T.pentandra* (Desv.)Pall.的细嫩枝叶，亦供药用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

