

四花青皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/319/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_9B\\_E8\\_8A\\_B1\\_E9\\_9D\\_92\\_E7\\_c22\\_319467.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E5_9B_9B_E8_8A_B1_E9_9D_92_E7_c22_319467.htm)

药品名称四花青皮  
其它名称青橘皮，青柑皮，小青皮，青皮 类别中药材图片来源为芸香科植物福橘

*Citrus tangerina* Hort. et Tanaka或朱

橘*C.erythro*sa Tanaka 等多种橘类的未成熟的果皮或幼果。药材四花青皮：

外形不一，裂片多数为长椭圆形，边缘多向内卷曲，皮薄。外皮黑绿色或青绿色，有皱纹。内面黄白色，有脉络纹。断面边缘有油点，气清香，味苦辛。以皮黑绿色、内面白色、油性足者为佳。个青皮：呈不规则的圆球形。表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。以坚实、个整洁、皮厚、香气浓者为佳。性味归经苦辛，微温。入肝、胆经。功用主治疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癥块。宜忌气虚者慎服。用法用量内服：煎汤；或入丸、散。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)

个青皮：呈不规则的圆球形。表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。以坚实、个整洁、皮厚、香气浓者为佳。性味归经苦辛，微温。入肝、胆经。功用主治疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癥块。宜忌气虚者慎服。用法用量内服：煎汤；或入丸、散。

表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。以坚实、个整洁、皮厚、香气浓者为佳。性味归经苦辛，微温。入肝、胆经。功用主治疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癥块。宜忌气虚者慎服。用法用量内服：煎汤；或入丸、散。

以皮黑绿色、内面白色、油性足者为佳。个青皮：呈不规则的圆球形。表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。以坚实、个整洁、皮厚、香气浓者为佳。性味归经苦辛，微温。入肝、胆经。功用主治疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癥块。宜忌气虚者慎服。用法用量内服：煎汤；或入丸、散。

以皮黑绿色、内面白色、油性足者为佳。个青皮：呈不规则的圆球形。表面深灰色或黑绿色，有细皱纹及小瘤状突起。基部有果柄痕，指划之可见油迹。以坚实、个整洁、皮厚、香气浓者为佳。性味归经苦辛，微温。入肝、胆经。功用主治疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疔癥块。宜忌气虚者慎服。用法用量内服：煎汤；或入丸、散。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)