

2012年内科护理：美尼尔氏病症状与治疗 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/4/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_4060.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_4060.htm) 美尼尔氏病症状：眩晕，耳鸣，耳聋

，头胀满感，眼震，听力检查。【常见症状】1.眩晕 多呈突发性旋转性眩晕。睁眼时自觉周围物体沿一定方向与平面旋转，或左右摇晃感。闭目时上述症状减轻。因此发作时病人常采取一定的体位闭目静卧，不敢转动。尽管有时因惊吓而倒地，但神志完全清楚。病人常伴有恶心呕吐、面色苍白、出冷汗及血压下降。数分钟或数小时后自然缓解。症状消失，转入间歇期。间歇期的长短因人而异，有终生只发作一次者，也有反复多次发作者。2.耳鸣 患耳初为低调吹风声耳鸣，久之则成高音调持续性耳鸣。眩晕发作时多突然耳鸣加剧，间歇期耳鸣程度自然减轻或消失。3.耳聋 早期不自觉耳聋，多次眩晕发作后始感明显。一般为单侧。偶呈双侧性。耳聋在眩晕发作时加重，间歇期好转，呈波动的性听力损害，严重时可有波动。听力损害的总趋势，常随发作次数每况愈下。4.头胀满感 眩晕发作期间，部分患者有患侧头部或耳内胀满感、沉重、压迫感，或耳周围灼热感。5.眼震 在发作高潮时观察患者的眼球，一般可见到有快慢相的不自主的颤动。6.听力检查 显示感音神经性耳聋。【治疗】1、发作期应卧床休息，低盐饮食，少喝水。2、镇静剂：发作期用安定，可抑制眩晕和呕吐。3、血管扩张药物。4、维生素类药物：维生素B1、维生素B6、维生素E等口服。5、利尿剂。6、手术疗法：对发作频繁、保守治疗无效，眩晕迁延影响工作和生活者，可考虑手术治疗。包括：内淋巴囊切开术、球囊

切开术、迷路切除术、经颅中窝或经迷路后前庭神经切除术等。7、采用中医药治疗，疗效很好且治疗效果稳定、理想且无任何副作用，治愈后不易复发。【护理要点】 护理者要照顾好患者在发病时的任何起术活动，诸如大小便、漱口等，要防止倾跌受伤。 患者尽量不做转体活动，以免诱引晕眩。 如眩晕症状持久不退，头痛加剧，应去医院治疗。

特别推荐：[2011年护士资格证成绩查询时间](#)

[2011年护士资格证分数线](#) [2012年执业护士考试介绍](#)

更多信息请访问：[护士考试辅导无忧通关班](#)

[护士论坛](#) [护士在线题库](#) 相关推荐：

[2012年内科护理：哮喘的家庭护理](#) [2012年内科护理：支气管哮喘病的护理要点](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)