

2012年护士考试手术室护理：麻醉前饮食控制与用药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_4193.htm

麻醉前用药：巴比妥类，镇痛类，抗胆碱类，安定类。饮食控制：麻醉前常规禁食12h，禁饮水4~6h，除门诊小手术外均应严格遵守这一常规。

一、饮食控制 为防止麻醉意外，麻醉前常规禁食12h，禁饮水4~6h，除门诊小手术外均应严格遵守这一常规。

二、麻醉前用药

- 1.巴比妥类：有镇静、催眠和抗惊厥作用，并能防止和减轻局麻药中毒反应。常用的有苯巴比妥钠0.1g，麻醉前半小时肌注。
- 2.镇痛类：提高痛阈，强化麻醉效果，减少麻药用量和减轻内脏牵拉反应，常用药物有吗啡和哌替啶，吗啡5~10mg皮下注射，哌替啶50~100mg肌注，此类对呼吸中枢有抑制作用，吗啡作用更强，小儿、老人慎用，孕妇产前禁用。
- 3.抗胆碱类：抑制腺体分泌从而减少呼吸道和口腔液体分泌，保持呼吸道通畅，并能防止迷走神经兴奋，从而避免心动过缓和骤停。常用药物有阿托品0.5mg和东莨菪碱0.3mg，麻醉前半小时肌注，由于该类药能抑制汗腺分泌和影响心血管活动，故对甲亢、高热、心动过速患者不宜使用。
- 4.安定类：可使情绪稳定，抗焦虑、抗惊厥，并有中枢性肌肉松弛作用，还有一定的抗局麻药中毒作用。常用的有地西洋5~10mg或氟哌啶5mg，术前半小时肌注。

相关推荐：[#0000ff>2012年护士考试手术室护理：局部麻药中毒及护理](#) [#0000ff>2012年护士考试手术室护理：全身麻醉的护理](#) 热点推荐：[#0000ff>2011年护士资格考试合格分数线预测](#) 学习技巧：[#0000ff>2012年护士考试考前十大知识点](#) [#0000ff>顺利通过护士资格考试的实用](#)

技巧 特别推荐：#0000ff>2012年护士资格考试介绍 #0000ff>执业护士资格考试大纲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com