

妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理汇总-护士资格考试-

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/4/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A6\\_8A\\_E5\\_A8\\_A0\\_E3\\_80\\_81\\_E5\\_c21\\_4369.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022__E5_A6_8A_E5_A8_A0_E3_80_81_E5_c21_4369.htm)

本章节主要对妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理进行了详细的讲解与说明。护士资格考试考试大纲还未出来，百考试题网小编根据2011年的考试大纲，特对妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理这个知识点进行收集整理，以便大家更加系统性的进行复习。护士资格考试妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理汇总

**第一节 女性生殖系统解剖生理** 妇女一生各时期都有不同的组织学、解剖学变化及生理特点。女性生殖系统的功能、生理变化与其他系统的功能息息相关，且能相互影响。结合临床讲解各生理阶段常见病防治。

**女性生殖系统解剖与生理**

**女性生殖系统的概述**

**生殖系统生理**

**女性生殖系统的病原体**

**女性生殖系统的传染途径**

**第二节 妊娠期妇女的护理** 妊娠期妇女的护理重点：妊娠期母体变化，胎先露，胎产式，胎方位，骨盆测量，妊娠期的健康教育。难点：胎盘的形成，胎先露，胎产式，胎方位的理解，骨盆内外测量的方法。

**第三节 分娩期妇女的护理** 分娩期妇女的护理重点：分娩的分期和临床表现，阿氏评分的内容和运用，胎盘剥离征象。难点：分娩机转。

**第四节 产褥期妇女的护理** 产褥期是指胎儿、胎盘娩出后的产妇身体、生殖器官和心理方面调适复原的一段时间，需6~8周，也就是42~56天。在这段坐月子的6~8周时间内，产妇应该以休息为主，尤其是产后15天内应以卧床休息为主，调养好身体，促进全身器官各系统尤其是生殖器官的尽快恢复。

**产褥期妇女乳**

房的护理 blue>产褥期妇女的会阴护理 blue>产褥期妇女的心理护理 blue>第五节 流产病人的护理 流产后子宫内膜留有创伤，术后1~2周内会有阴道出血，一般血少于月经量或相似，均为正常，如超过2周血仍未干净或期间血超过月经，阴道出血有较多血块伴发热者应立即到医院就诊。 blue>人工流产手术病人心理护理 blue>先兆流产护理 blue>流产后护理七个注意事项 blue>第六节 早产病人的护理 早产儿是指胎龄不足37周的新生儿。由于早产儿各系统器官发育不成熟，易发生硬肿症、窒息等并发症。如治疗护理措施不当，易导致死亡或存活后智力低下，所以早产儿的护理非常重要。 blue>早产儿护理要点 blue>早产的常见病因 blue>早产儿消毒隔离护理 blue>第七节 过期妊娠病人的护理 平时月经周期规则，妊娠达到或超过42周尚未临产称过期妊娠。多认为过期妊娠与胎儿肾上腺皮质功能有关，也可能与遗传有关。 blue>过期妊娠的相关因素 blue>过期妊娠病理生理 blue>过期妊娠的概述 blue>过期妊娠的护理 blue>气囊助产应用于过期妊娠的产程护理 blue>第八节 妊娠高血压疾病病人的护理 保持环境安静，避免声光刺激，一切治疗活动和护理操作尽量轻缓且相对集中。密切观察生命体征的变化，注意孕妇有无头晕、头痛、眼花等自觉症状的出现，备好急救车、吸引器、开口器、氧气、等急救药品。 blue>妊娠期高血压疾病的护理 blue>妊娠期高血压疾病的分类 blue>第九节 异位妊娠病人的护理 异位妊娠的观察及护理包括：症状，体征，诊断，治疗，护理。 blue>第十节 胎盘早剥病人的护理 过科学家数十年的研究，发现胎盘早期剥离与高血压（包括妊娠高血压综合征，原发性高血压，肾性高血压）、创伤，胎膜早破、孕妇年龄、

吸烟，使用可卡因等因素相关，其发病可能与以下主要危险因素有关。

- blue>胎盘早剥的发病机制
- blue>胎盘早剥护理措施
- blue>胎盘早剥的原因

blue>第十一节 前置胎盘病人的护理

前置胎盘指胎盘附着于子宫下段，甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口处，其位置低于胎儿先露部。临床表现主要为妊娠晚期或临产时，突然发生无诱因的无痛性反复阴道流血。

- blue>前置胎盘病人的临床护理
- blue>前置胎盘病人标准护理计划
- blue>前置胎盘患者的护理

blue>第十二节 羊水量异常病人的护理

正常妊娠16周时约为250ml，妊娠晚期约1000ml（800ml~1200ml），足月妊娠羊水量约为800ml，羊水在胎儿与母体间不断交换，维持动态平衡。

- blue>羊水的量
- blue>羊水过少的病因
- blue>羊水过多常见病因

blue>第十三节 多胎妊娠及巨大胎儿产妇的护理

一次妊娠同时有两个或两个以上的胎儿，称为多胎妊娠。胎儿体重4000g称为巨大胎儿。通过正常产道常发生困难，发生肩性难产机会多，需手术助产，处理不当可发生软产道损伤或子宫破裂。

- blue>多胎妊娠的病因
- blue>多胎妊娠的孕期护理
- blue>多胎妊娠的产褥期护理

- blue>巨大儿对母婴的预后影响及对策
- blue>巨大胎儿
- blue>巨大胎儿高危因素

blue>第十四节 胎儿宫内窘迫病人的护理

胎儿在宫内有缺氧征象危及胎儿健康和生命者称为胎儿宫内窘迫。胎儿宫内窘迫是一种综合症状，是当前剖宫产的主要适应征之一。

- blue>胎儿宫内窘迫的护理
- blue>胎儿宫内窘迫的发病原因
- blue>胎儿宫内窘迫的临床表现

blue>第十五节 胎膜早破病人的护理

胎膜早破是指在临产前胎膜自然破裂孕龄<37孕周的胎膜早破又称为早产(未足月)胎膜早破，胎膜早破是围生期最常见的并发症，可以对孕产妇、胎儿和新生儿

造成严重不良后果。 [胎膜早破护理措施](#) [防止胎膜早破的护理](#) [胎膜早破病因](#) [第十六节 妊娠期合并症病人的护理](#) 在未孕之前或妊娠期间发生的非妊娠直接引起的疾病称妊娠期合并症。又称妊娠加杂症。妊娠终止，疾病也不一定随之消失。常见的影响较大的妊娠合并症有心脏病、慢性高血压病、糖尿病、肝炎、贫血等。 [妊娠合并糖尿病的处理原则](#) [妊娠合并急性阑尾炎知识](#) [妊娠合并泌尿系感染](#) [第十七节 产力异常病人的护理](#) 正常宫缩有一定节律性、极性和一致性，并有相应的强度和频率。出现异常时，则称为产力异常，分为宫缩乏力、不协调及亢进三种，以宫缩乏力最常见。 [产力异常的预防](#) [产力异常的诊断](#) [产力异常的发病原因](#) [第十八节 产道异常病人的护理](#) 产道异常包括骨产道（骨盆）及软产道（子宫下段、子宫颈和阴道）异常，其中以骨产道异常多见。 [产道异常](#) [软产道异常](#) [骨产道异常处理原则](#) [产道异常的处理原则及护理](#) [第十九节 胎位异常病人的护理](#) 胎位异常是造成难产的常见因素之一。分娩时枕前位(正常胎位)约占90%,而胎位异常约占10%，其中胎头位置异常居多，占6%-7%，有胎头在骨盆腔内旋转受阻的持续性枕横(后)位，有因胎头俯屈不良呈不同程度仰伸的面先露，还有胎头高直位、前不均倾位等。 [第二十节 产后出血病人的护理](#) 胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过500ml者，称为产后出血。此为产科常见的严重并发症，为产科危症之一，应特别重视。 [产后出血心理护理](#) [产后大出血的护理](#) [产后出血性休克病人的护理](#) [第二十一节 羊水栓塞病人的护理](#) 羊水栓塞是由于羊水及其内有形物质进入母体血液循环引起

的病势凶险的产科并发症，临床上较少见，但死亡率较高。

blue>羊水栓塞的急救护理 blue>羊水栓塞的紧急处理 blue>羊水栓塞三个阶段临床表现blue>第二十二节 子宫破裂病人的护理 子宫破裂是指子宫体部或子宫下段于分娩期或妊娠期发生裂伤，为产科严重并发症，威胁母儿生命。主要死于出血、感染休克。 blue>子宫破裂常见病因 blue>子宫破裂修补术的手术治疗 blue>子宫破裂修补术的术前准备 blue>子宫破裂修补术的适应症 blue>子宫破裂的处理blue>第二十三节 产褥感染病人的护理 产褥感染产褥感染是指分娩时及产褥期生殖道受病原体感染，引起局部和全身的炎性应化。发病率为1%~7.2%，是产妇死亡的四大原因之一。 blue>产褥感染的护理要点 blue>控制产褥感染应以预防为主 blue>产褥感染的病理生理 blue>产褥感染病因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)