

2012年护士妇产科护理：巨大胎儿高危因素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_4426.htm

巨大胎儿高危因素：糖尿病，营养与孕妇体重，遗传因素，环境因素，产次，过期妊娠，羊水过多 流行病学调查发现巨大胎儿的发生与糖尿病、营养、遗传、环境等因素有关。 1.糖尿病 糖尿病孕妇巨大胎儿的发生率为26%，而无糖尿病孕妇的发生率仅为5%~8%。其原因可能是孕妇血液中葡萄糖含量升高，通过胎盘进入胎儿血循环，而胰岛素不能通过胎盘，致使胎儿长期处于高血糖状况，刺激胎儿胰岛 β 细胞增生，分泌大量胰岛素，或胰岛素样生长因子，活化氨基酸转移系统，促进脂肪、蛋白合成并抑制脂解作用，使胎儿脂肪聚集，导致巨大胎儿。 2.营养与孕妇体重 孕妇孕前体重与巨大胎儿有关，当体重指数BIM（体重/身高²）大于30kg/m²，巨大胎儿的发生率明显增加；孕期营养过剩、肥胖、体重过重等均可发生巨大胎儿。有研究表明孕期体重过重者发生妊娠期糖尿病、巨大胎儿、肩难产的几率较体重偏低者明显增高。医学教育网收集*整理 3.遗传因素 巨大胎儿的发生与遗传关系密切。身材高大的父母其子女为巨大儿的发生率高；不同民族、不同种族巨大胎儿的发生率各不相同。 4.环境因素 巨大胎儿的发生可能与环境有关。高原地区由于空气中氧分压低，巨大胎儿的发生率较平原地区低。 5.产次 巨大胎儿多见于经产妇，有资料报道胎儿体重随分娩次数增加而增加。 6.过期妊娠 少数过期妊娠胎盘功能正常，子宫胎盘血供良好，使胎儿不断生长发育，体重随孕期延长而增加。过期妊娠巨大胎儿的发生率较足月妊娠发生

率增加3~7倍，肩难产发生率增加2倍。7.羊水过多 羊水过多者巨大胎儿发生率高于羊水过少者。相关推荐：

#0000ff>2012年护士妇产科护理：巨大胎儿 #0000ff>妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理汇总 热点推荐：#0000ff>2011年护士资格考试合格分数线 特别推荐：#0000ff>护士资格考试介绍 #0000ff>执业护士资格考试大纲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com