

晚期产后出血常见病因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022__E6_99_9A_E6_9C_9F_E4_BA_A7_E5_c21_4439.htm 晚期产后出血常见病因

：胎盘、胎膜残留是最常见的原因，蜕膜残留，子宫胎盘附着部位复旧不全，剖宫产术后子宫伤口裂开。感染，肿瘤。

1.胎盘、胎膜残留是最常见的原因，多发生于产后10天左右。

粘附在子宫腔内的小块胎盘组织发生变性、坏死、机化，可形成胎盘息肉。当组织脱落时，基底部血管受损，引起大量出血。

2.蜕膜残留：蜕膜剥离不全，长时间残留，影响子宫复旧，继发子宫内膜炎症，可引起晚期产后出血。

3.子宫胎盘附着部位复旧不全：子宫胎盘附着面血管在分娩后即有血栓形成，随着血栓机化，出现玻璃样变，血管上皮增厚，管腔变窄、堵塞。

胎盘附着部边缘有内膜向内生长，底蜕膜深层的残留腺体和内膜亦重新生长，使子宫内膜得以修复，此过程需6~8周。

如果胎盘附着面感染、复旧不全可使血栓脱落，血窦重新开放，导致子宫大量出血。

4.剖宫产术后子宫伤口裂开。5.感染：以子宫内膜炎为多见，炎症可引起胎盘附着面复旧不全及子宫收缩不佳，导致子宫大量出血。

6.肿瘤。相关推荐：#0000ff>2012年护士妇产科护理：产褥感染的病理生理和临床表现 #0000ff>妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理汇总

热点推荐：#0000ff>2011年护士资格考试合格分数线 特别推荐：#0000ff>护士资格考试介绍 #0000ff>执业护士资格考试大纲

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com