

氨基酸及蛋白质类药:木糖醇 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E6_B0_A8_E5_9F_BA_E9_85_B8_E5_c23_451914.htm 药物名称 木糖醇药物
别名 木糖醇、木胶醇Xylitolum英文名称 Xylitol说明 功用作用
可用于糖尿病患者作为糖的代用品。此外，尚有抑制酮体生成的作用，能使血浆脂肪酸生成减少。可用作糖尿病、手术麻醉时酮中毒的合并用药。本品在体内胰岛素缺乏时，代谢不受影响，具有补充热量和体液、改善糖代谢、消除酮血的作用，既是糖尿病患者代谢异常的调整剂，又是一种新的能量补充物。在常规剂量下对肝、肾功能无明显影响。用法用量 口服，一日25-50g，分3-4次服，调于饮食中服用更佳。静注一次25-30g。[用法及用量]静注，10%~20%溶液，每次20~40ml。静滴，5%~10%溶液，每次500~1000ml。必要时可适当增加用量，但每日不超过100g。本品静滴速度以每小时0.3g/kg以下为宜，浓度过高、速度过快可致代谢性酸中毒，引起肾脏、大脑功能损伤。[剂型与规格]注射剂：2g/支，4g/支，25g/500ml。注意事项 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com