

临床执业医师妇产科学应试习题集及答案（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_452802.htm 275.卵巢肿瘤最常见的并发症是 A.蒂扭转 B.囊肿破裂 C.感染 D.恶变 E.囊内出血

答案：A 276.20岁妇女，发现腹胀，食欲下降2个月，检查发现：腹膨隆，肛查子宫正常大，右下腹包块，如婴儿头颅大，活动，剖腹探查：腹水淡黄。清，2000ml，子宫正常大小，双输卵管，左卵巢，大网膜，阑尾外观未见异常，右卵巢包块直径10cm，表面呈结节状，切面似脑组织，质脆，冰冻切片示：右卵巢未成熟性畸胎瘤，手术范围最佳应为 A.右卵巢切除术 B.右附件切除 子宫全切术 C.双附件切除 子宫切除术 D.双附件切除 子宫切除 大网膜切除 E.双附件 子宫 大网膜 阑尾切除 答案：D 277.下列与雌激素分泌无关的疾病是 A.子宫内膜癌 B.子宫内膜增殖症 C.卵巢颗粒细胞瘤 D.卵巢无性细胞瘤 E.子宫肌瘤 答案：D 278.45岁，下腹部包块半年，2年前因胃癌手术治疗。妇科检查：外阴、阴道无异常，宫颈光滑，宫体正常大小，双侧附件区均可触及鹅卵大小实性肿物，活动良好，最可能的诊断是 A.卵巢浆液性囊腺瘤 B.卵巢粘液性囊腺瘤 C.卵巢库肯勃瘤 D.卵巢颗粒细胞瘤 E.卵巢畸胎瘤 答案：C 279.输卵管卵巢囊肿与单纯卵巢囊肿的鉴别，下述哪项是错误的 A.解剖部位不同 B.病理机制不同，前者是炎症，后者是新生物 C.前者与子宫关系密切，后者一般不密切 D.前者多为双侧，后者多为单侧 E.前者壁厚，后者一般壁薄 答案：B 280.58岁，绝经5年后阴道断续少量出血2个月，左侧附件区拳头大包块，阴道脱落细胞检查显示有中度影响，子宫内膜活

检为内膜增生过长，可能为 A.卵巢纤维瘤 B.卵巢浆液性囊腺癌 C.卵巢畸胎瘤 D.卵巢颗粒细胞瘤 E.卵巢黏液性囊腺瘤 答案：D

281.下述哪种情况不是急性生殖器炎的后遗病变 A.输卵管积水 B.输卵管卵巢囊肿 C.卵巢巧克力囊肿 D.慢性盆腔结缔组织炎 E.慢性输卵管炎 答案：C

282.52岁，腹胀伴消瘦3个月，检查发现患者腹部明显膨隆，为确定是否为卵巢恶性肿瘤，哪项病史、体检不重要 A.叩诊确定是否有腹水存在 B.妇科检查触及盆腔肿物或直肠陷凹处沙粒样结节 C.必要时放腹水后再内诊，并送腹水找癌细胞 D.近期有无腹泻、发热 E.询问慢性肝肾疾病史 答案：E

283.33岁，诊断为左附件肿物行开腹术，术中见少量血性腹水，子宫正常大小，左卵巢肿物6cm × 7cm × 8cm，实性，表面有乳头生长，质脆，与大网膜及肠管有粘连，应行的术式是 A.肿物切除术 B.双侧附件切除术 C.全子宫切除术及双附件切除术 D.左附件切除术 E.全子宫及双附件切除术，同时行大网膜切除术及盆腔淋巴结清除术 答案：E

284.50岁，月经不规则2年，3~4天/2~3个月，妇科学普查发现右侧卵巢肿物6cm × 5cm × 4cm，质硬，活动差，最恰当的处理是 A.短期内严密观察 B.定期随访，等待绝经后肿物自行消失 C.收入院择期手术治疗 D.化疗 E.腹腔镜检查进一步确诊 答案：C

285.19岁少女，自觉腹部包块半年，未见迅速增大，月经正常。下腹偏右可触及囊性包块，如儿头大小，活动佳。腹部X线平片见右下腹数块大小不等的钙化影，应诊断为 A.结核性盆腔炎性包块 B.卵巢皮样囊肿 C.子宫肌瘤 D.卵巢癌 E.卵巢巧克力囊肿 答案：B

286.17岁少女，发现下腹部肿物2个月，肿物生长迅速，腹水征（ ），肛查子宫细长，左附件区触及手拳大肿物，实性，AFP升高，应诊为 A.卵巢颗

粒细胞瘤 B.卵巢无性细胞瘤 C.卵巢癌 D.卵巢未成熟畸胎瘤 E.卵巢库肯勃瘤 答案：D

287.子宫内膜癌侵犯宫颈首选治疗 A.全子宫双附件切除术 B.广泛性子宫切除及盆腔淋巴结清除术 C.子宫全切术 D.孕酮治疗 E.放射治疗 答案：E

288.患者65岁，主诉血性白带，妇科检查：子宫颈无糜烂，宫体稍大，后穹窿分泌物涂片检查找到癌细胞。进一步处理最佳 A.B超检查 B.碘试验 C.阴道镜检查 D.分段诊断性刮宫 E.宫颈荧光检查 答案：D

291.已婚妇女，既往月经规律，停经3个月后出现腹痛及阴道流血来诊。妇科检查见宫口未开，子宫儿头大，质软，双侧附件区均触及约手拳大小、囊性、活动度好、无压痛之肿物，分泌物为陈旧血性，尿妊娠试验阳性。则双侧附件区肿物可能为 A.双侧输卵管积水 B.双侧输卵管卵巢囊肿 C.双侧卵巢巧克力囊肿 D.双侧卵巢黄素囊肿 E.双侧卵巢浆液性囊腺瘤 答案：D

292.葡萄胎的确诊依据是 A.子宫增大已4个月，听不到胎心音 B.阴道排出物中有水泡状组织 C.血清-HCG超过100kU / L，持续不降 D.子宫大于相应妊娠月份 E.B超检查见宫腔内充满弥漫光点和小囊样无回声区 答案：B

293.绒癌与侵蚀性葡萄胎的主要鉴别依据是 A.尿HCG阳性 B.X线胸片有棉团状阴影 C.不规则阴道流血 D.阴道有紫蓝色转移结节 E.病理检查：无绒毛结构 答案：E

294.侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌均可发生于 A.自然流产后 B.人工流产后 C.输卵管妊娠后 D.葡萄胎排空后 E.足月分娩后 答案：D

295.鉴别侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌，正确的是 A.有黄素囊肿者为侵蚀性葡萄胎 B.子宫标本镜下未见绒毛结构，仅能见到成团的滋养细胞者为绒毛膜癌 C.侵蚀性葡萄胎都有肺内转移，而绒毛膜癌无肺内转移 D.两者发病都可继发于足月产或流产后 E.葡萄胎清宫

后间隔半年以上者为绒毛膜癌 答案：B 296.侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是 A.肺内转移 B.阴道转移 C.脑转移 D.盆腔转移 E.肝转移 答案：A 297.绒毛膜癌最主要的转移途径是 A.直接侵犯 B.淋巴转移 C.血行转移 D.种植 E.弥漫性播散 答案：C 299.24岁，已婚，停经2个半月，阴道少量出血。妇科检查：子宫增大如妊娠4个月大小，软，于子宫右侧触及一约7cm直径大小的囊性包块，表面光滑，活动，无压痛。右侧囊性包块最可能的诊断是 A.卵巢黄体囊肿 B.卵巢黄素囊肿 C.输卵管结核性包块 D.卵巢巧克力囊肿 E.单纯性卵巢囊肿 答案：B 300.下述哪项看法不符合滋养细胞疾病流行病学特点 A.各国间葡萄胎的发病率无明显差异 B.>40岁妇女妊娠时易患葡萄胎 C. D.葡萄胎的恶变率随年龄而增加 E.恶性滋养细胞肿瘤的发生与口服避孕药有关 答案：A 301.葡萄胎排空后随访时最重要的检查项目是 A.B超检查 B.阴道脱落细胞涂片检查 C.盆腔内诊检查 D.X线胸片 E.血HCG检查 答案：E 302.下列哪项不属于WHO对滋养细胞肿瘤预后评分项目 A.年龄 B.孕产次 C.夫妇双方血型 D.转移部位 E.HCG水平 答案：B 303.关于葡萄胎正确的是 A.卵巢黄素化囊肿的出现意味着恶变 B.葡萄胎水泡来源于蜕膜细胞 C.部分性葡萄胎染色体核型常为46XY，系由空卵受精 D.完全性葡萄胎染色体核型常为46XX，均来源于精子 E.欧美国家发病率最高 答案：D 304.葡萄胎清宫后HCG转阴时间一般不超过 A.1周 B.3周 C.6周 D.9周 E.12周 答案：E 305.绒癌与侵蚀性葡萄胎的局部治疗哪项是错误的 A.外阴、阴道转移，局部可注射5-Fu B.盆腔转移可采用髂内动脉或子宫动脉插管化疗 C.脑转移时，鞘内注射MTX D.胸腔转移可局部注入5-Fu E.一般情况下可以口服5-Fu 答案：E 306.下

列哪项是葡萄胎刮宫后非常规随访的项目 A.妇科检查随访黄素囊肿情况 B.相当时期内指导避孕 C.定期做HCG定量测定 D.定期做阴道细胞涂片检查 E.必要时作胸部X线摄片 答案：D

307.葡萄胎2次清宫术后6个月，阴道断续流血，妇科检查：阴道口5点处见2cm紫蓝色隆起物，宫颈光滑，子宫稍大，软，双附件正常。胸片未见异常，尿妊娠试验（ ），挖除阴道病灶病理组织学切片见到成堆高度增生滋养细胞及血块，无绒毛阴影，最可能的诊断是 A.子宫复旧不良 B.流产 C.吸宫不全 D.绒毛膜癌 E.侵蚀性葡萄胎 答案：D

308.关于良，性葡萄胎的处理，下列哪项是错误的 A.一经诊断，应尽快排空子宫 B.子宫过大者应行第2次刮宫 C.应取近子宫壁的刮出物送病理检查 D.葡萄胎排出后，均应进行预防性化疗 E.40岁以上的妇女水泡较小，滋养层细胞增生明显，可考虑切除子宫 答案：D

309.绒毛膜癌最可靠的确诊依据是 A.阴道可见紫蓝色转移结节 B.X线胸片可见转移阴影 C.刮宫术后血HCG持续阳性不转阴 D.卵巢黄素囊肿持续下 E.子宫病理学检查仅见滋养细胞而无绒毛结构 答案：E

310.关于良性葡萄胎的处理，下列哪项是错误的 A.一经诊断，应尽快排空子宫 B.1周后行第2次刮宫 C.取刮出的大水泡送病理检查 D.术后严密随访 E.40岁以上的妇女可行子宫全切术 答案：C

311.绒癌不继发于以下哪种情况 A.流产后 B.足月产后 C.葡萄胎后 D.异位妊娠后 E.卵巢颗粒细胞瘤术后 答案：E

312.25岁妇女，诊断为绒癌，下列哪项不正确 A.以综合治疗为主 B.一般情况下，术前应先行化疗 C.如绒癌侵犯子宫肌壁，应行子宫全切术 D.5-Fu与更生霉素合用，效果较好，化疗时多选用 E.阴道转移灶一般不必切除 答案

：C 313.侵蚀性葡萄胎可以发生于 A.葡萄胎以后 B.流产以后

C.足月产以后 D.异位妊娠以后 E.过期流产以后 答案：A

314.28岁已婚妇女，停经2个多月，阴道不规则出血2周，G0P0，妇科检查：宫颈蓝，子宫增大如孕3个多月，附件（-），尿妊娠免疫试验（ ），经刮宫确诊为葡萄胎，其处理不应包括 A.需再清宫术 B.每次清宫，刮出物均送病理 C.子宫全切术 D.清宫术后应定期检查血HCG变化 E.葡萄胎刮宫术后8周血HCG仍高提示浸润性葡萄胎 答案：C

315.50岁，因不规则阴道出血，尿妊娠免疫试验（ ），行刮宫术，未刮出组织，而又行子宫切除，病理检查子宫肌层中有大片滋养细胞浸润，及一个淡淡的绒毛影子，诊断应是 A.胎盘组织残留 B.合体细胞子宫内膜炎 C.绒癌 D.侵蚀性葡萄胎 E.葡萄胎 答案：D

316.下列哪项不是葡萄胎患者的高危因素 A.子宫大于停经月份，尤其宫底达脐平者 B.早婚，多产 C.年龄大于40岁 D.两次刮宫后血HCG水平持续升高 E.伴有咯血 答案：B

317.侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌鉴别诊断的主要依据是 A.黄素囊肿长期不消失 B.阴道出血持续60天以上 C.有无肺内转移灶 D.病检有无绒毛结构 E.葡萄胎清宫术后血HCG持续阳性超过4周 答案：D

318.葡萄胎刮宫后，应对患者密切随访，以下哪项不正确 A.刮宫后每月取血查HCG，结果阴性后每3个月查1次 B.注意有无阴道出血及咯血 C.盆腔检查注意子宫大小及卵巢黄素囊肿是否逐渐缩小 D.必要时胸部摄片检查 E.必要时做脑部CT检查 答案：A

319.25岁，已婚，停经2个月，阴道出血2周，下腹坠痛1周，晨起排便后剧烈腹痛，伴晕厥，查体：血压70/40mmHg，脉弱，下腹部压痛，反跳痛（ ），移动性浊音（ ），阴道有血，宫口松，子宫增大如孕3个多月大小，左侧壁压痛明显，附件未触及肿物，但压痛明显，后穹窿穿刺

抽出不凝血，尿妊娠免疫（ ），应诊为 A.异位妊娠 B.子宫肌瘤合并妊娠，先兆流产 C.双胎，先兆流产 D.侵蚀性葡萄胎 E.宫角妊娠，破裂 答案：D 320.关于滋养叶细胞肿瘤，下述哪项是错误的 A.侵蚀性葡萄胎只发生在良性葡萄胎后 B.绒癌可发生于流产，足月产及葡萄胎后 C.滋养叶细胞肿瘤可继发于异位妊娠 D.合体细胞子宫内膜炎可属于滋养叶细胞肿瘤 E.绒癌尿妊娠免疫试验均为阳性 答案：E 321.有关妊娠滋养细胞疾病，下述错误的是 A.葡萄胎时HCG水平较相应月份正常妊娠高 B.绒癌HCG水平比侵蚀性葡萄胎高 C.葡萄胎确诊后应及早行清宫术 D.肺转移是绒毛膜癌最常见的部位 E.侵蚀性葡萄胎病变在子宫，化疗无效时可切除子宫 答案：B 322.临床检查以下哪项证明为侵蚀性葡萄胎 A.葡萄胎伴有转移病灶即证明为恶性 B.X线胸部检查无肺部病变，即可除外侵蚀性葡萄胎 C.葡萄胎刮宫后阴道出血诊刮，未刮出组织即可除外恶性 D.葡萄胎刮宫后4周，尿妊娠免疫试验持续（ ），诊断侵蚀性葡萄胎 E.葡萄胎刮宫术后尿妊娠免疫阴性1年后又转阳，即可诊断侵蚀性葡萄胎 答案：B 323.葡萄胎彻底清宫后，血HCG达正常的时间最迟不应超过 A.6周 B.8周 C.10周 D.12周 E.14周 答案：E 324.已婚女性，停经2个半月，阴道出血时多时少，查体：子宫增大，如孕4个月大小，子宫双侧均可触及直径约6cm囊性包块，表面稍不平，活动，无压痛，尿妊娠免疫试验（ ），盆腔包块最可能的诊断为 A.卵巢黄体囊肿 B.卵巢黄素囊肿 C.输卵管结核包块 D.单纯性卵巢囊肿 E.卵巢转移性肿瘤 答案：B 325.女性，停经90天，近日阴道有少量不规则出血，小腹隐痛，妇科检查见子宫高达脐，未能触及胎体，B超子宫腔内为落雪状图像，则应考虑为 A.葡萄胎 B.羊水过多 C.

先兆流产 D.子宫肉瘤 E.子宫肌瘤 答案：A 326.下述哪项不符合合体细胞子宫内膜炎的情况 A.多发生在产后，流产或葡萄胎后 B.胎盘附着处有滋养细胞浸润 C.常有不规则的阴道出血，子宫复旧不良 D.经抗炎治疗或彻底刮宫后能恢复正常 E.尿妊娠免疫试验多为（ ） 答案：D 327.葡萄胎刮宫5个月，妊娠免疫试验又呈（ ），肺部已出现转移灶，最大的可能为 A.又一次葡萄胎 B.侵蚀性葡萄胎 C.绒癌 D.异位妊娠 E.宫内妊娠 答案：B 328.葡萄胎刮宫半年内以下哪项处理是对的 A.半年查尿妊娠免疫试验1次 B.尿妊娠免疫试验阴性即可再次妊娠 C.多合并功能性子宫出血予以止血治疗 D.术后8周尿妊娠免疫试验持续阳性按异常处理 E.尽量不做阴道检查以防感染 答案：D 329.葡萄胎组织学检查特征正确的是 A.滋养细胞有不同程度的增生 B.绒毛间质细胞增生活跃 C.绒毛间质呈退行性变 D.绒毛间质中可见到毛细血管为完全性葡萄胎的主要特征 E.水肿的绒毛侵入子宫浅肌层 答案：A 330.恶性滋养层细胞肿瘤最常见的转移途径为 A.淋巴转移 B.血行转移 C.由官腔经输卵管延及腹腔 D.穿破子宫浆膜层进入腹腔或破入阔韧带内 E.经宫颈黏膜下行至阴道 答案：B 331.侵蚀性葡萄胎的诊断依据是 A.葡萄胎的大小 B.滋养细胞的增生程度 C.血HCG浓度 D.有葡萄状物侵入肌层 E.高龄妇女 答案：D 332.绒癌最常见的转移部位是 A.阴道 B.脑 C.肺 D.消化道 E.肾 答案：C 333.与葡萄胎诊断不符的临床表现是 A.阴道不规则流血 B.轻微阵发性腹痛 C.胸痛及咯血 D.高血压蛋白尿 E.闭经 答案：C 334.40岁女性4个月来，月经欠规律，淋漓不止，1天前突然一过性跌倒，意识丧失，肢体失灵，失语等，几秒钟后恢复。末次妊娠10年前，流产刮宫。检查子宫稍大，软，附件无异常，为迅速确

诊应行 A.脑脊液检查 B.脑血管造影 C.血HCG检查 D.宫腔镜
E.诊断性刮宫 答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com