

2007年口腔执业医师考试习题整理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_452806.htm

- 1.最易患龋的恒牙是第一恒磨牙。最易患龋的乳牙是第一乳磨牙，最不易患龋的乳牙的下颌前牙。
- 2.代表口腔卫生指数的是OHI
- 3.咬肌间隙感染常见原因是智齿冠周炎。
- 4.创伤性牙周炎的X线表现：根周膜增宽；牙槽骨垂直吸收，硬骨板消失或中断，临床上常有窄而深的牙周袋存在。牙合创伤对牙周病的主要作用是改变炎症的扩散途径。（但单纯的牙合创伤不会导致炎症的发生和牙周袋的形成，而是通过改变炎症扩散至牙周支持组织的途径和影响牙周组织破坏的程度而促进炎症的发展。）
- 5.翼外肌痉挛主要表现为开口受限。
- 6.单根牙牙周膜面积以牙颈部最大。
- 7.病毒在体内传播途径有：血液，神经两种。病毒由胎盘或产道由亲代传播给子代的方式为垂直传播。虫媒，水平，消化道传播是病毒在人群个体间的传播方式。
- 8.糖皮质激素不可用于白色念珠菌感染。
- 9.食物糖中单糖成分是果糖。
- 10.根尖距上颌窦底最近的是上颌第一磨牙，第二磨牙次之，第三磨牙及第二双尖牙更次之。
- 11.人工后牙牙合平面偏低是咬舌的主因。
- 12.上颌神经出颅部位是圆孔；下颌神经出颅部位是卵圆孔，面神经出颅部位是茎乳孔。
- 13.含嗜酸性上皮细胞的腺肿瘤是WARTHIN瘤；基底细胞腺瘤是单形性腺瘤，伴间质样分化的腺肿瘤是多形性腺瘤。
- 14.与致病相关的细菌结构荚膜。
- 15.脱敏疗法是用小量，多次，短时间间隔注射变应原，消耗体内IGE抗体，使机体处于暂时脱敏状态，然后注射大剂量变应原以达到治疗目的。常用于对抗毒素过敏但又急需注射

的病人。 16.人体内氨最主要的代谢去路是肝中合成尿素。 17.在人本主义（询者中心）治疗中最重要的是倾听 18.诊断甲亢最有意义的体征是甲状腺血管杂音。 19.临床上边缘性颌骨骨髓炎常继发于咬肌间隙感染。 20.华氏位片中显示最佳的结构是上颌窦。 21.疱疹性龈口炎多见于六个月至三岁婴儿。 22.可复性牙髓炎选用的盖髓剂是氧化锌丁香油糊剂。 23.行牙裂植骨术最佳手术时机是9 - 12岁。 24.青霉素的作用机制是破坏细胞壁的肽聚糖。 25.阿托品对眼睛的作用是散瞳，升高眼内压，调节麻痹。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com