

西医综合外科学部分背记知识要点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E8_A5_BF_E5_8C_BB_E7_BB_BC_E5_c73_455457.htm 28 . 四岁小儿头颈部

和右下肢全部烧伤 . 其面积为36% (1988) 30 . 下列乳房肿块可能发生6% ~ 8%恶变的是乳管内乳头状瘤 (1988) 31

. 细菌性肝脓肿，哪项是正确的起病骤急，体温可高达39 ~ 40 (1988) 32 . 儿童甲状腺结节有多少机会是恶性的?50%

(1989) 35 . 输库血每超过800毫升后，应注射 10% 葡萄糖酸钙10毫升 (1989) 37 . 不宜施行择期手术的肺最大通气量是在预计值60%以下 (1989) 38 . 头面部污染性伤口清创缝合的时限最长为8 ~ 12小时 (1989) 47 . 一幽门梗阻病人，血氯83毫克当量 / 升，血钾3 . 2毫克当量 / 升，应补给何种液体?生理盐水 + 氯化钾 (1991) 48 . 下列术后引流管的处理方法中，哪项是错误的? A . 各种引流管注意无堵塞、扭曲、脱出 B . 注意记录引流液的色泽和量 C . 置于胆道的" T"形管引流一律在术后一周拔除 D . 胃肠减压管在胃肠功能恢复后拔出 E . 乳胶片引流多在术后24 ~ 48小时拔出 (答案C) (1991) 50 . 急性胰腺炎，血清淀粉酶升高的规律为发病后3 ~ 12小时开始升高，24 ~ 48小时达到高峰 (1991) 25 . 手术区皮肤消毒范围 . 应包括切口周围5cm (1992) 76 . 肛裂最常见于膝胸位12点处 (1992) 68 . 关于外科感染分类的叙述，哪项是错误的? A . 丹毒、急性阑尾炎、急性乳腺炎等均属特异性感染，非一般感染 B . 急性感染指病程在三周以内 C . 条件性感染指平常为非致病的病原菌乘机体抵抗力下降时乘机而人所引起的感染 D . 院内感染的主要致病菌是条件致病

菌E，病程超过二个月者为慢性感染（答案A）（1993）78．胆总管探查术后所置T形管拔除指征中，下列哪项不正确？A．术一周B．血胆红素正常C．病人体温正常D．病人无腹痛、腹胀等症状E．T管造影示肝内外胆管显影不正常（答案A）（1994）159．应用三腔管压迫治疗食管静脉曲张破裂出血，下列哪些处理是正确的，病人应取侧卧位或头部侧转放置时间一般不宜持续超过3-5天 每隔12小时应将气囊放空10~20分钟（1994）79．急性肾功能衰竭多尿期每日补液量相当于每日排出水分量的 $1/3 \sim 1/2$ （1995）85．卧床、无发热或异常消耗的成年男性病人每天最低热卡需要是25~30大卡/公斤体重（1995）91．关于胆石症，哪项是正确的？胆囊结石多为胆固醇结石或混合结石（1996）80．下列有关乳腺癌的描述，哪项是错误的？A．乳房外上象限发生率最高，接近50% B．骨转移的主要部位是肋骨 C．"橘皮征"是皮内和皮下淋巴管被癌细胞堵塞所致 D．Paget病的原发灶在乳头区的大乳管内 E．治疗方针应是尽早手术，辅以放、化疗等综合疗法（答案B）（1997）82．面颊部开放性损伤后12小时，局部的处理宜清创后一期缝合（1997）84．三年前曾行破伤风自动免疫者，受伤后应作下列哪项处理即可预防破伤风？需再次注射破伤风类毒素0.5ml（1997）85．深度烧伤，若无感染等并发症，通常愈合时间为3~4周（1997）160．关于局麻药的叙述，哪些是正确的？普鲁卡因主要被血浆假性胆碱酯酶水解 利多卡因主要在肝脏内被分解 普鲁卡因的成人一次限量为1g（1997）76．有关外科感染，下列哪项不正确？A．约占外科疾病的 $1/3 \sim 1/2$ B．疖、丹毒、急性阑尾炎等均属非特异性感染 C．病程在2个月之内者均属急性感染 D．医

院内感染的主要病菌是条件性病原菌 E . 外科感染病程中 , 常发展为混合感染 (答案 C) (1998) 77 . 瘢痕性幽门梗阻病人术前纠正体液代谢和酸碱平衡失调时 , 选用的液体应为 5 % 葡萄糖盐水 + 氯化钾液 (1998) 78 . 病人术后的处理中哪项不正确? A . 胃肠道手术病人肛门排气后 , 可开始进食 B . 腹部的减张缝线一般在术后 2 周左右拆除 C . 伤口的乳胶片引流一般在术后 4 ~ 7 天拔除 D . 一般性手术后的病人 . 应鼓励早期活动 E . 术后尿潴留导尿量超过 500ml 者 , 应留置尿管 1 天 ~ 2 天 (答案 C) (1998) 79 . 神经阻滞麻醉时 , 局麻药 100ml 内加用肾上腺素的最佳剂量为 0 . 5mg (1998) 83 . 有关脾破裂 , 哪项是错误的? A . 发病率占腹部损伤的 40% ~ 50% B . 真性破裂约占脾破裂的 85% C . 脾破裂的治疗原则是紧急手术处理 D . 成人脾切除术后 , 暴发型感染的发病率一般认为不超过 1% E . 脾切除术后暴发型感染以大肠杆菌为主要病原 (答案 E) (2004) 78 . 关于自体输血 , 下列哪种说法是错误的? A . 自体输血不会发生溶血、发热和过敏反应 B . 当应用血液稀释回输的方法输血时 , 最好是先采的先输 , 后采的后输 C . 脾破裂或异位妊娠破裂出血手术时 , 可采用自体失血回输 D . 预存自体库血的输入时间一般不宜超过 10 日 E . 胸、腹腔开放性损伤 , 超过 4 小时以上者 , 被认为自体输血的禁忌证 (答案 B) (1999) 80 . 乙型肝炎表面抗原阳性病人所用的手术器械 , 术后使用哪种处理正确? 2% 戊二醛水溶液浸泡 1 小时 (1998) 81 . 下列哪项关于中心静脉压的叙述是不正确的? A . 中心静脉压的正常值是 0 . 49 ~ 0 . 98kPa (5 ~ 10cmH₂O) B . 中心静脉压的变化一般比动脉压变化较晚 C . 中心静脉压低于 0 . 49kPa (5cmH₂O) 时 , 表示血容量不足 D . 中心静脉压

高于1.47kPa(15cmH₂O)时，提示有肺循环阻力增加，心功能不全 E. 中心静脉压受血容量、静脉血管张力等因素的影响 (答案B) (1999) 82. 下列哪项不是ARDS初期的临床表现 A. 呼吸加快 B. 呼吸窘迫感，用一般的吸氧法不能得以缓解 C. 呼吸道分泌物增多，肺部有湿音 D. X线胸片一般无明显异常 E. PaO₂降至8.0kPa(60mmHg) (答案C) (1999) 79. 下列有关体液的叙述，哪项是正确的?细胞内液量在男性约占体重的40%，绝大部分存在于骨骼肌中 (2000) 80. 下列哪项不符合全胃肠外营养所用的营养液的要求? A. 每日供氮应达0.2-0.24g/kg体重 B. 氮(日)和热量之比为1:100kcal C. 含有适量的电解质、维生素和微量元素 D. 适量补充胰岛素和脂肪乳剂 E. 所补充的必需氨基酸和非必需氨基酸的含量一般应为1:2 (答案B) (2000) 86. 下列哪项叙述不符合小儿急性阑尾炎的临床特点? A. 有右下腹明显压痛和肌紧张的典型体征 B. 病情发展快且较重，早期即出现高热、呕吐等症状 C. 穿孔率可达30% D. 并发症和死亡率较高 E. 治疗原则是早期手术 (答案A) (2000) 88. 由于内痔的动脉供应，其好发部位多在截石位的3、7、11点 (2000) 111. 直肠癌块下缘距肛门12cm适用经腹腔直肠癌切除术 (2000) 77. 经高压蒸气灭菌的物品一般可保留14天 (2001) 78. 当病人出现血容量不足的症状时，说明在短期内体液丧失至少已达体重的5% (2001) 85. 预防甲状腺肿的碘化食盐，常用剂量为每10-20kg食盐中均匀地加入碘化钾或碘化钠1.0g (2001) 86. 行胃癌根治术时，手术切除至少应离癌肿边缘多远才算足够?6~8cm (2001) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com