

氨气中毒症状与体征以及应急处理办法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E6_B0_A8_E6_B0_94_E4_B8_AD_E6_c62_457038.htm 1．轻度中毒：眼和上呼吸道刺激症状，肺部有干罗音。 2．中度中毒：剧烈咳嗽，呼吸困难，肺部有干湿罗音，化学性肺炎和肺水肿。 3．重度中毒：咳粉红色泡沫痰，气急，胸闷，心悸，紫绀，两肺有干湿罗音，肺水肿。 现场急救：将患者移到空气新鲜处，呼吸停止应做人工呼吸（注意：发现有肺水肿者，不准做人工呼吸），呼吸困难应输氧，用大量水冲洗患处，但不能冲洗冻伤处，脱掉污染的衣服，迅速给予治疗护理。 医疗措施：积极防治中毒性肺水肿，早期，足量，短程应用糖皮质激素及超声雾化吸入，对由气道粘膜脱落引起的窒息或自发性气胸应作好应急处理的准备如环甲膜穿刺或气管切开胸腔穿刺排气等，应加强消毒隔离及早并较长时间应用抗菌素。立刻将患者转移到空气新鲜的地方，然后，给其输氧。进入眼睛时，将患者躺下，用水洗涤角膜至少5分钟。其后，再用稀醋酸或稀硼酸溶液洗涤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com