

临床医师内科学（含传染病学）消化系统试题及答案（二）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8C_BB_E5_c22_459539.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题相应字母所属的方框涂黑。 1

. 关于肝硬化腹水形成的因素，不正确的是 A A.原发性醛固酮增多 B.门静脉压力增高 C.低白蛋白血症 D.肝淋巴液生成过多 E.抗利尿激素分泌过多 2. 肝硬化患者因腹泻发生昏迷，查血钾2.6mmol/L，血钠136mmol/L，血氯化

物110mmol/L，血氨158.7 μ mol/L，血pH7.40.宜选用的药物是 B A.谷氨酸钠 B.谷氨酸钾 C.盐酸精氨酸 D.乳果糖 E.左旋多巴

3. 肝硬化患者出现下列情况，除哪项外均应怀疑癌变 E A.短期出现肝脏迅速增大 B.持续性肝区疼痛 C.无其他原因可解释的发热 D.虽经积极治疗而病情迅速恶化 E.腹水由漏出液转为渗出液 4. 肝硬化患者有出血倾向，与下列哪

项因素关系最小 B A.肝合成凝血因子减少 B.低白蛋白血症 C.毛细血管脆性增加 D.脾功能亢进 E.胃肠道黏膜炎症糜烂 5.

诊断肝性脑病最有意义的体征是 D A.肌张力增高 B.腱反射亢进 C.踝阵挛阳性 D.扑翼样震颤 E.巴彬斯基（Babinski）征

阳性 6. 女，38岁，肝硬化腹水患者。1周来畏寒发热，体温在38 左右，全腹痛，腹部明显膨隆，尿量500m下列体征应特别注意 E A.蜘蛛痣及肝掌 B.腹壁静脉曲张 C.脾肿大 D.腹部移动性浊音 E.全腹压痛及反跳痛 7. 诊断肝性脑病最有

意义的实验室检查是 B A.血糖 B.血氨 C.血胆红素 D.血尿素氮 E.血转氨酶 8. 肝肾综合征主要与下列哪项因素有关 C

A.肾小管坏死 B.肾小球坏死 C.肾皮质血流量减少 D.肾间质炎性病变 E.胆红素对肾脏的毒性 9. 对诊断门脉高压症最有价值的是 D A.腹水 B.脾大 C.肝大、质硬 D.食管吞钡X线检查 E.黄疸、下肢浮肿 10.

当腹内有游离腹水出现移动性浊音时，游离腹水量至少应超过 D A.100ml B.200ml C.500ml D.1000ml E.2000ml 11.

肝性脑病患者的饮食治疗不恰当的是 C A.高热卡 B.高碳水化合物 C.高蛋白质 D.高维生素 E.不能进食可鼻饲或静滴葡萄糖 12.

男，40岁。乙型肝炎病史已10年，2年前拟诊肝硬化。1周来出现腹胀及巩膜黄染，腹水检查为血性渗液。为明确诊断，下列哪项检查最为重要 C A.尿胆红素及尿胆原检查 B.肝功能检查 医学教育网搜集整理 C.血AFP检查 D.肝B超检查 E.肝活检 13.

肝硬化病人不会出现下列哪项内分泌失调的表现 D A.雌激素增多 B.雄激素减少 C.醛固酮增多 D.肾上腺糖皮质激素增多 E.抗利尿激素增多 14.

肝硬化并发自发性腹膜炎，腹水的性质为 E A.血性 B.乳糜性 C.渗出液 D.漏出液 E.介于渗出液与漏出液之间 15.

对肝硬化诊断有确诊价值的检查是 B A.X线钡餐检查 B.腹腔镜检查 活检 C.胃镜检查 D.腹部B超 E.腹部CT 16.

肝硬化腹水患者，一般每日进水量宜控制为 B A. < 500ml B.500 ~ 1000ml C.1000 ~ 1500ml D.1500 ~ 2000ml E.2000 ~ 2500ml 17.

下列哪项不属于门脉高压症候群 A A.肝脏增大 B.脾脏增大 C.食管和胃底静脉曲张 D.痔核形成 E.腹水 18.

我国肝硬化最常见的病因是 C A.中毒性肝炎 B.酒精性肝炎 C.病毒性肝炎 D.营养不良性肝炎 E.血吸虫病性肝炎 19.

下列哪一项不是肝硬化腹水治疗必须遵循的原则 E A.腹水患者必须限制钠、水的摄入 B.留钾利尿剂和排钠利尿剂并用 [医

学 教育网搜集整理] C.服用呋塞米利尿时应补充氯化钾 D.腹水减退后，仍需限制钠的摄入 E.快速利尿消退腹水可促使病情缓解 20 . 下列哪项实验室检查结果不符合肝硬化失代偿期 D A.胆固醇常低于正常 B.肝硬化严重坏死时天门冬氨酸氨基转移酶（AST）活力常增高 C.血清MAO增高 D.凝血酶原时间延长，注射维生素K可以纠正 E.血清白蛋白减少， γ -球蛋白显著增高 21 . 肝性脑病患者灌肠或导泻时应禁用 D A.25%硫酸镁 B.生理盐水 C.生理盐水加食醋 D.肥皂水 E.乳果糖加水 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com