

临床执业医师妇产科学应试习题集及答案（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/459/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_459542.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_459542.htm)

386.子宫内膜异位症最多见于 A.直肠子宫陷凹 B.宫颈 C.腹膜 D.输卵管 E.卵巢 答案：E

387.子宫内膜异位症重要的临床特点是 A.腹痛于经期第1~2天开始 B.大腿两侧疼痛 C.经期腹痛，肛门口坠胀感 D.痛经进行性加重 E.继发性进行性痛经 答案：E

388.丹那唑治疗子宫内膜异位症的药理作用，错误的是 A.抑制下丘脑性腺激素释放激素和（或）垂体促性腺激素 B.直接与子宫内膜雌、孕激素受体结合 C.直接抑制卵巢甾体类激素的产生 D.增加体内雌二醇和孕酮的清除率 E.促使异位内膜转变为增殖期子宫内膜 答案：E

389.经产妇40岁，继发性痛经1年余逐渐加重，查子宫后倾，球状质硬，附件未见异常，可能是 A.妊娠子宫 B.子宫肌炎 C.子宫腺肌症 D.畸形子宫 E.子宫肌瘤 答案：C

390.35岁，婚后5年未孕，2年来经血量增多，伴经期腹痛加重，妇科检查：后穹窿可触及黄豆大小数个触痛结节，子宫后位，略大，质中等，活动差，子宫右侧可触及5cm×5cm×4cm包块，质韧，不活动，压痛，此患者最可能的诊断是 A.子宫浆膜下肌瘤 B.子宫腺肌瘤 C.子宫内膜异位症，伴右卵巢巧克力囊肿 D.右侧卵巢畸胎瘤 E.结核性盆腔包块 答案：C

391.关于子宫内膜异位症临床表现错误的是 A.子宫内膜异位的部位不同症状差别大 B.异位的子宫内膜面积大，则症状明显 C.痛经的特点为继发性和进行性加重 D.不育因盆腔粘连，子宫后倾，卵巢功能失调及性交疼痛 E.体征随病变部位不同而改变 答案：B

392.37岁，因左附件肿物10cm×10cm×9cm拟

入院手术，入院后2h突感下腹剧痛，再次妇科检查：左侧肿物隐约可及，大小边界不清，后穹窿穿刺抽出10ml深咖啡粘稠液体，最可能的诊断是 A.卵巢肿物蒂扭转 B.卵巢肿物破裂 C.卵巢巧克力囊肿破裂 D.残角子宫妊娠破裂 E.子宫浆膜下肌瘤蒂扭转 答案：C

393.关于子宫内膜异位症，下述哪项是错误的 A.常发生在生育年龄 B.妊娠后症状可以缓解，甚至消失 C.子宫腺肌症是内在性子宫内膜异位症 D.最常发生的部位是卵巢 E.异位内膜很少发生恶变 答案：C

394.关于子宫内膜异位症，下述哪项是错误的 A.子宫腺肌症是子宫内膜异位症 B.常发生在生育年龄 C.最常发生的部位是卵巢 D.妊娠后症状可以缓解，甚至消失 E.很少发生恶变 答案：A

395.关于子宫内膜异位症的治疗，下列哪项是错误的 A.孕激素治疗 B.假孕治疗 C.放射治疗 D.半根治性手术 E.根治性手术 答案：C

396.28岁，孕3产1，确诊为双侧卵巢巧克力囊肿，左侧肿物8cm × 8cm × 9cm，右侧肿物5cm × 5cm × 4cm，最适宜的处理原则是 A.随访观察 B.假孕治疗 C.假绝经治疗 D.保留卵巢功能手术 E.根治性手术 答案：D

397.32岁女性，孕2产1，5年来痛经，近2年加重，需服止痛药物，查体：子宫经产大小，后位，质中，活动差，右旁可触及直径5cm囊肿，活动差，后陷凹(-)。该病发病原因下列哪项不正确 A.由月经血播散引起 B.月经期做盆腔检查可引起 C.机体免疫功能紊乱可引起 D.卵巢生发上皮和腹膜化生可引起 E.子宫肌瘤和子宫肥大症可引起 答案：E

398.34岁妇女，已生育，痛经3年加重半年，月经量偏多，查体：子宫中位，经产大小，质中，活动稍差，右附件增厚，伴压痛，左附件未及异常，后陷凹可触及黄豆大小硬节、有触痛，以下处理哪项不正确 A.行B超检查 B.行腹腔镜

检查 C.试用假孕疗法 D.试用妇康片治疗 E.行宫腔镜检查 答案

: E 399.30岁，婚后3年未孕，月经规则，近2年出现进行性痛经，曾行输卵管通液检查，显示通畅，妇科检查：子宫正常大小，后位，不活动，后壁有触痛性小结节，左附件可触及4cm×3cm×3cm包块，不活动，有压痛，为进一步确诊，应首选何种检查 A.子宫内膜病理检查 B.基础体温测定 C.腹腔镜检查 D.输卵管碘油造影 E.剖腹探查 答案：C

400.44岁女性，G4P3，人流刮宫1次。月经量多2年，有大血块，伴贫血。查体：子宫中位，如孕9周大小，硬呈球形，活动，B超子宫11cm×9cm×8cm大小，后壁明显增厚。下列叙述哪项错误

A.子宫腺肌症可能性大 B.子宫肌瘤不能除外 C.应做腹腔镜检查明确诊断 D.可开腹行子宫切除术 E.应做宫腔镜检查除外黏膜下肌瘤 答案：C

401.关于子宫内膜异位症与子宫腺肌症，下列哪项是错误的 A.子宫内膜异位症是子宫内膜组织生长在官腔以外的部位，而引起病变及症状 B.子宫腺肌症是正常位置的子宫内膜向肌层内良性侵入，伴子宫肌层弥漫性增生 C.子宫内膜异位症异位的子宫内膜受卵巢孕激素影响有相应变化 D.子宫腺肌症侵入肌壁的子宫内膜不受性激素影响 E.子宫腺肌症也是一种子宫内膜异位症 答案：E

402.应用孕激素治疗有效的是 A.一度闭经 B.功血子宫内膜萎缩型 C.子宫内膜结核 D.子宫内膜异位症 E.过期流产 答案：D

404.28岁女性，不孕，进行性痛经5年，经前1~2天开始下腹、腰痛，经后渐消失，查体：子宫大小正常，后倾，粘连，双侧卵巢均有约直径6cm之囊肿，欠活动，阴道后穹窿处有紫蓝色结节，双骶韧带串珠状痛性结节，根据上述症状体征应考虑下述何种诊断 A.慢性盆腔炎 B.结核性盆腔炎 C.子宫内膜异位症 D.双侧输

卵管卵巢囊肿 E.卵巢癌 答案：C 410.28岁闭经2年，黄体酮试验阳性，雌激素试验阳性，典型垂体兴奋试验，LH值比注射前高4倍，请问此患者为下述哪种闭经 A.子宫性 B.卵巢性 C.垂体性 D.下丘脑性 E.大脑皮质功能失调 答案：D 411.为确定患者为子宫内膜脱落不全时，取子宫内膜行镜检的最合适时间是 A.月经来潮12h内 B.排卵期前后 C.月经来潮第5~6天 D.月经前期 E.月经期任何时间 答案：C 412.与子宫内膜癌的癌前病变关系最密切的是 A.子宫内膜腺瘤型增生过长 B.子宫内膜腺囊型增生过长 C.子宫内膜不典型增生过长 D.萎缩型子宫内膜 E.增生期子宫内膜 答案：C 413.21岁未婚女性，原发闭经就诊，检查：营养发育中等，女性体态，外阴发育正常，肛查子宫略小，双附件未及异常，该患者闭经的原因可能为哪项 A.子宫性闭经 B.卵巢性闭经 C.多囊卵巢综合征 D.闭经泌乳综合征 E.下丘脑性闭经 答案：E 414.下列哪一项不是无排卵型功血的病理改变 A.萎缩型子宫内膜 B.子宫内膜腺瘤样增生过长 C.子宫内膜脱落 D.增生期子宫内膜 E.子宫内膜腺囊型增生过长 答案：C 415.35岁已婚女性，G1P0，既往月经规律，但1年以来月经周期混乱，经期持续时间延长，经量不多，伴腰痛，末次月经19天至今未净，以下哪项诊断可能性最小 A.子宫肌瘤 B.无排卵型功血 C.排卵型功血 D.宫内节育器 E.子宫内膜炎 答案：B 416.导致青春期无排卵型功血的原因是 A.不能形成正常月经周期中的FSH和LH峰状分泌 B.雌激素水平低落 C.黄体功能不足 D.内膜前列腺素含量过高 E.雌、孕激素水平均低落 答案：A 417.48岁妇女，妊2产1，近2年来月经周期混乱，经量时多时少，最近闭经2个月后阴道淋漓出血半月多来诊，以下检查除哪项外可考虑无排卵功血 A.子宫正常大小，

双附件压痛、增厚 B.子宫口松软，有活动出血 C.B超示子宫内膜厚 D.尿HCG阴性 E.基础体温呈双相 答案：B

418.30岁女患者，停经70天突然阴道出血，持续了10天，检查见：子宫正常大小，宫颈粘液见典型羊齿叶状结晶，应考虑为 A.子宫性闭经 B.卵巢性闭经 C.无排卵型功血 D.异位妊娠流产 E.黄体萎缩不全 答案：C

419.关于黄体发育不全，哪项错误 A.孕激素水平不够，子宫内膜分泌反应不良 B.月经周期缩短，往往伴不孕 C.基础体温双相型 D.黄体期短，约10天 E.基础体温下降缓慢，逐渐下降 答案：E

420.30岁，结婚5年不孕，月经周期不规则，子宫内膜出现下列哪种组织学表现时为有排卵 A.子宫内膜分泌期 B.子宫内膜萎缩期 C.子宫内膜增生过长 D.子宫内膜增生期中期 E.子宫内膜增生期晚期 答案：A

421.下述哪项不符合黄体功能不全 A.常不孕或流产 B.月经周期短，经量或多或少 C.基础体温双相 D.月经周期第20天尿中孕二酮醇4mg / 24h尿 E.月经来潮第一天阴道出现典型的羊齿状结晶 答案：E

422.关于青春期与围绝经期无排卵功血哪一项是错误的 A.两者均为下丘脑-垂体-卵巢轴功能失调所致 B.青春期功血子宫内膜为增殖型，围绝经期功血子宫内膜为分泌型 C.两者子宫内膜均为增殖型 D.两者在月经后半期均为低水平 E.青春期功血需用诱导排卵治疗，围绝经期功血则用调经及HRT 答案：B

423.30岁已婚妇女，闭经1年半，闭经半年时曾注射黄体酮5天，有阴道出血4天，以往月经2~3个月1次，尚规律。妇科检查无异常，黄体酮试验（ ），垂体兴奋试验静脉注射LH-RH50 μg，注射后半小时血LH值较注射前增高3倍，应诊断为 A.子宫性闭经 B.下丘脑性闭经 C.垂体性闭经 D.卵巢性闭经 E.其他内分泌腺紊乱 答案：B

424.关于无排卵性功能失调

性子宫出血的临床表现，下列哪项说法不正确 A.月经过多 B.腹部肿块 C.月经频发 D.子宫不规则出血 E.月经周期紊乱 答案：B

425.女性，32岁，人流后月经9~12天/22~24天，量较多，怀疑黄体功能不正常，应选什么时候用药 A.预计月经来潮前 B.月经来潮后 C.经后5天开始 D.排卵期 E.月经干净后 答案：A

426.27岁，月经频发，经血量正常，因婚后4年未孕来就诊。妇科检查：子宫后倾，正常大小，双附件无异常。基础体温呈双相型。最可能的诊断是 A.无排卵型功血 B.排卵期出血 C.黄体功能不全 D.子宫内膜脱落不全 E.子宫内膜炎 答案：C

427.关于子宫内膜的病理变化，下列说法错误的是 A.增生期子宫内膜是月经周期中的增生期的正常变化 B.无排卵型功血也可出现增生期子宫内膜 C.子宫内膜腺瘤型增生过长是一种癌前病变 D.子宫内膜腺囊型增生过长是无排卵性功血的表现 E.萎缩型子宫内膜是无排卵性功血的表现 答案：C

428.29岁，停经56天后阴道出血10天，检查：子宫正常大小，质软，宫颈粘液见典型羊齿叶状结晶，应考虑为 A.先兆流产 E.卵巢性闭经 C.异位妊娠 D.无排卵型功血 E.黄体萎缩不全所致的出血 答案：D

429.30岁，结婚4年未孕，月经稀发，测基础体温呈单相型，在月经来潮前5天取宫颈粘液检查，应是 A.典型羊齿状结晶 B.无结晶形成 C.典型椭圆体 D.不典型椭圆体 E.非典型羊齿状结晶与椭圆体共存 答案：A

430.38岁，继发不育，自然流产2次，月经规律（4~5天/20~23天），经量正常，无痛经。妇科检查无异常，应首先做下列哪项检查协助诊断 A.宫颈黏液检查 B.血LH、FSH测定 C.B超检查 D.腹腔镜检查 E.基础体温测定 答案：E

431.50岁，近1年来月经不规律，月经量增多，经期延长。妇科检查无异常发现，血红蛋

白90g / L，应做下列哪项处理 A.生殖激素测定 B.B超检查 C.诊断性刮宫 D.药物调整月经周期 E.雄激素止血 答案：C

432.24岁已婚，有功血史，此次停经3个月后，阴道持续出血40天，内诊子宫正常大小，双附件正常，血HCG正常，选择哪种方案为宜 A.诊断性刮宫 B.后穹窿穿刺 C.孕激素药物刮宫 D.口服避孕药 E.雄激素止血 答案：A

433.—16岁女学生，主诉月经初潮后一直紊乱1年半，本次月经持续1周不止。检查：面色苍白，阴毛稀少，阴道口可见暗红色血块，子宫稍小于正常，双侧附件正常。为止血首选的处理方法是 A.雌激素止血 B.孕激素止血 C.雌孕激素合并使用 D.其他止血药 E.诊刮止血 答案：C

434.青春期与更年期功能性子宫出血的治疗原则，下列哪一项不同 A.止血 B.调整周期 C.减少经量 D.改善全身状况 E.恢复卵巢功能 答案：E

435.—48岁妇女，G3P2，主诉18年前人流1次，现月经紊乱1年，末次月经10天前至今，近常感面色潮热。妇科检查：外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫正常大小，质中，无触痛，双附件正常，基础体温单相型，最可能的诊断是 A.子宫内膜炎 B.结核性子宫内膜炎 C.老年性阴道炎 D.子宫内膜癌 E.更年期功血 答案：E

436.更年期功能性子宫出血的激素变化是 A.LH水平低 B.FSH水平低 C.FSH及LH均低 D.FSH及LH均高 E.孕激素水平高 答案：D

437.45岁，不规则阴道出血年，表现为月经周期长短不一，出血量时多时少，血红蛋白100g / L，妇科检查：子宫正常大小，双附件（-），正确的处理方法是 A.雌激素治疗 B.口服避孕药 E.诊断性刮宫 D.全子宫切除术 E.前列腺素合成酶抑制 答案：C

438.49岁，月经增多，周期缩短，经期延长，子宫正常大小，双附件（-），服甲基睾A.素治疗无效，此次月经量极多

，面色苍白，本病例应采取的措施是 A.用抗纤溶药物止血 B.大剂量孕激素 C.大剂量雌激素 D.大剂量雄激素 E.诊断性刮宫  
答案：E 439.35岁，结婚3年未孕，月经周期3~4天/24~25天，经量正常，妇科检查：子宫正常大小，附件正常。月经来潮6h诊刮结果为部分内膜分泌反应正常，部分分泌反应不良，本病例最可能的诊断是 A.正常月经 B.无排卵型功血 C.黄体功能不全 D.子宫内膜脱落不全 E.子宫内膜结核 答案：C 440.闭经是指月经停止 A.至少3个月 B.至少6个月 C.至少12个月 D.至少2年 E.至少3年 答案：B 441.闭经患者雌激素试验阴性表示病变在 A.丘脑下部 B.卵巢 C.垂体 D.肾上腺 E.子宫 答案：E 442.原发性闭经患者，孕、雌激素试验均为阴性，其病变部位应确定在 A.子宫 B.卵巢 C.垂体 D.丘脑下部 E.肾上腺 答案：A 443.雌激素试验（-），血FSH增高的闭经患者应诊断为 A.结核性子宫内膜炎 B.Turner综合征 C.垂体微腺瘤 D.口服避孕药后闭经 E.多囊卵巢综合征 答案：B 444.下丘脑性闭经时功能试验的结果正确的是 A.孕激素试验（-），雌激素试验（-），促性腺激素试验（-），垂体兴奋试验（-） B.孕激素试验（-），雌激素试验（-），促性腺激素试验（-），垂体兴奋试验（-） C.孕激素试验（-），雌激素试验（-），促性腺激素试验（-），垂体兴奋试验（-） D.孕激素试验（-），雌激素试验（-），促性腺激素试验（-），垂体兴奋试验（-） E.孕激素试验（-），雌激素试验（-），促性腺激素试验（-），垂体兴奋试验（-） 答案：D 445.下列哪项同继发性闭经关系最密切 A.席汉综合征 B.尿崩症 C.单纯卵巢发育不全 D.睾丸女性化完全型 E.Turner综合征 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)