

有毒中药用法剂量汇总中医执业医师《中药学》辅导 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/463/2021_2022__E6_9C_89_E6_AF_92_E4_B8_AD_E8_c22_463015.htm 药名用法及剂量 马钱子 内服，宜制用，多入丸散服0.3-0.6克；外用适量，研末调涂 川乌 煎服，宜先煎，久煎至入口无麻味，1.5-3克；外用适量 草乌 煎服，宜先煎，久煎至入口无麻味，5-3克；外用适量 附子 煎服，宜先煎0.5-1小时，至口尝无麻辣感，3-15克 苍耳子 煎服或入丸散，过量服用易导致中毒，3-10克 水蛭 煎服，1.5-3克，研末服，0.3-0.5克。以入丸散研末为宜 全蝎 煎服，2-5克，研末服，每次0.6-1克。外用适量 蜈蚣 煎服1-3克，研末服，每次0.6-1克。外用适量 雄黄 研末内服0.05-0.1克，入丸散，水飞，忌火煨；外用不宜大面积及长期使用 硫磺 内服1.5-3克，入丸散；外用适量 巴豆 入丸散，每次0.1-0.3克制成霜；外用适量 砒石 入丸散，每次0.002-0.004克，忌火煨；外用适量 轻粉 入丸散，每次0.1-0.2克；外用适量 铅丹 入丸散，每次0.3-0.6克；外用适量，不可持续使用 斑蝥 入丸散，0.03-0.06克；外用适量 蟾酥 入丸散，每次0.015-0.03克；外用适量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com