

2007年执业医师考试模拟试题及答案解析：妇科学8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/464/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c67_464897.htm

一、以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 盆腔子宫内膜异位症最常见的部位是 A.卵巢 B.宫旁韧带 C.阔韧带 D.输卵管 E.子宫直肠陷凹 答案：A 题解：具有生长功能的子宫内膜组织生长在子宫腔以外的部位，称子宫内膜异位症。盆腔子宫内膜异位症最常见的部位是卵巢。

2. 关于女用短效口服避孕药的副反应，正确的是 A.类早孕反应是由于孕激素刺激胃粘膜所致 B.服药期间在月经周期前半期发生不规则少量出血 C.雌激素不足引起 D.白带增多是孕激素作用的结果 E.体重增加系孕激素引起钠水潴留的结果 答案：B 题解：避孕药的副反应有：类早孕反应，胃黏膜被雌激素刺激引起恶心、头晕、食欲不振等。阴道不规则流血（突破性出血）多见于服用短效避孕药者。月经前中期出血，多因雌激素不足，可加服炔雌醇0.005~0.015mg；若在后半期出血，可能因孕激素不足，可加服避孕片1/2~1片，至22天服完。月经过多、经期延长多见于使用长效剂型者。

3. 子宫脱垂的主要病因是 A.习惯性便秘 B.分娩损伤 C.过度负重 D.产后长期哺乳 E.绝经期后盆底肌萎缩松弛 答案：B 题解：分娩损伤和产褥早期体力劳动是子宫脱垂的主要原因。分娩时盆底肌肉、韧带及筋膜过度伸展、撕裂未予及时修补；或虽缝合但愈合不良，使子宫及阴道失去强有力的支托而下垂。产后过早参加体力劳动可发生子宫脱垂。

4. 急性淋病治疗首选 A.庆大

霉素 B.红霉素 C.青霉素 D.丙磺舒 E.氟哌酸 答案：C 题解：药物以青霉素为首选，主张大剂量一次能彻底治愈，夫妻双方同治。对青霉素过敏者可选用四环素、红霉素、强力霉素、氟哌酸。对青霉素耐药者可选用壮观霉素、头孢三嗪。重型淋菌性盆腔炎、输卵管积脓或输卵管卵巢脓肿者，经2~3天药物治疗无改善，应行手术治疗。

5. 关于排卵性功能
性出血的治疗，下列哪项是正确的 A.排卵期出血可从月经第1
天起服雌激素 B.排卵型月经过多用大量雌激素止血 C.内膜脱
落不全用氯酚胺（克罗米酚）治疗 D.黄体功能不全可在体温
升高第3天起用HCG治疗 E.黄体功能不全亦可给甲基睾丸素
治疗 答案：D 题解：排卵型功能性出血的治疗为：下次月经
前10~14日开始，每日口服甲羟孕酮10mg.作用是调节下丘脑-
垂体-卵巢轴的功能，使黄体及时萎缩，内膜及时完整脱落。
还可促卵泡发育和排卵，以利于正常黄体的形成。基础体温
上升后3天起注射HCG2000~3000U肌注，隔日一次，共5次，
有刺激及维持黄体功能的作用。

100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com