

临床执业医师历届真题解析--妇产科（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/466/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c67\\_466041.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c67_466041.htm)

101.女，27岁。妊娠38周，伴头痛、头晕、视物不清1天。体格检查BP180 / 110mmHg，尿蛋白（ ），浮肿（ ），胎心140次 / 分。肛诊子宫颈管未消失。NST为无反应型，最恰当的处理是2002  
A.静脉滴注硫酸镁，继续妊娠 B.降压利尿 C.治疗4天无好转行剖宫产术 D.促宫颈成熟 E.治疗同时立即剖宫产 您所选的答案

： 本题正确答案：E 102.胎盘早剥的主要病理变化是2001 A.底蜕膜出血 B.真蜕膜出血 C.包蜕膜出血 D.胎盘边缘血窦破裂出血 E.以上都不是 您所选的答案： 本题正确答案：A

103.初孕妇，26岁。妊娠34周。因腹部直接受撞击出现轻微腹痛，伴少量阴道流血，胎心142次/分。恰当处理应是2001 A.静脉滴注止血药物 B.卧床休息，给予镇静药观察病情变化 C.立即肛查，了解宫口扩张情况 D.立即阴道检查，根据宫口扩张程度决定分娩方式 E.立即行剖宫产结束妊娠 您所选的答案： 本题

正确答案：B 104.24岁初产妇，规律宫缩10小时，连续观察2小时，宫口由6cm开大至7cm，胎头1，胎心140次 / 分。本例恰当的处置应是2003 A.严密观察产程进展 B.肌注哌替啶（杜冷丁） C.静脉滴注缩宫素 D.立即行人工破膜 E.立即行剖宫产术 您所选的答案： 本题正确答案：C

105.不协调性子宫收缩乏力的恰当处理应是2003 A.针刺合谷、三阴交穴位 B.温肥皂水灌肠 C.肌注哌替啶 D.人工破膜 E.静脉滴注缩宫素 您所选的答案： 本题正确答案：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)