

中国药典2000版一部：红药贴膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/468/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_468643.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/468/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_468643.htm)

中药名称红药贴膏  
拼音名Hongyao Tiegao来源本品为三七、白芷、土鳖虫、红花等药味经加工制成的橡胶膏。性状本品为淡红色片状橡胶膏；气芳香。鉴别(1)取本品(除去盖衬)约0.2g，置洁净的试管中，顶端倒置滴有适量香草醛试液的盖玻片或悬挂香草醛试液湿润的滤纸条，微火加热试管的底部，香草醛试液(或滤纸条)显红色。(2)取本品(除去盖衬)约2g，加乙醚20ml、水10ml，振摇20分钟，放置，滤过，取乙醚液约10ml，置水浴上蒸干，残渣加无水乙醇1ml，搅拌，使溶解，加硫酸0.5ml，显红色。另取乙醚液约10ml，置水浴上蒸干，加氯仿10ml，振摇10分钟，分取氯仿液，置水浴上蒸干，残渣加发烟硝酸0.5ml，蒸干，放冷，加乙醇-氢氧化钾试液(1:10)1~2滴，显红色。检查含膏量照橡胶剂含膏量测法(附录Q)，每100cm<sup>2</sup>应不低于1.6g。其他应符合橡胶膏剂项下有关的规定(附录Q)。功能与主治活血去瘀，止痛生新。用于跌打损伤，筋骨肿痛，远近瘀患。用法与用量外用。洗净患处，贴敷，1~2日更换一次。注意凡对橡皮膏过敏及皮肤有破伤出血者不宜贴敷。贮藏置阴凉干燥处。

100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)