

中国药典2000版一部：茴香橘核丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/469/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_469401.htm 中药名称茴香橘核丸拼音名Huixiang Juhe Wan性状本品为黄褐色至棕褐色的水丸；气香，味微酸、辛苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：不规则团块无色或淡黄色，表面及周围扩散出众多细小颗粒，久置溶化。草酸钙簇晶细小，直径约 $5\mu\text{m}$ ，一个细胞含多个簇晶，草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。种皮石细胞类多角形，壁极厚，波状弯曲，胞腔分枝。纤维壁稍厚，表面有斜向交错的纹理。纤维束鲜黄色，周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。纤维成束，深棕色或红棕色，壁厚。木纤维长梭形，直径 $16\sim 24\mu\text{m}$ ，壁较厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。厚壁组织碎片绿黄色，细胞类多角形或略延长，壁稍弯曲，有的连珠状增厚，纹孔细密。种皮栅状细胞淡棕色或红棕色，表面观类多角形，壁稍厚，胞腔含红棕色物。种皮细胞黄棕色，表面观类多角形，壁较厚。内胚乳碎片无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。藻体碎片橄榄褐色。鳞甲碎片无色，有大小不等圆孔。(2)取本品18g，研细，加乙醇25ml，摇匀，放置过夜，滤过，取滤液3ml置具塞试管中，加5%硫酸溶液1ml，混匀，试管中悬挂一条三硝基苯酚试纸，密塞，热水浴中放置10分钟，试纸显砖红色。(3)取本品18g，研细，加乙醚25ml，摇匀，放置过夜，滤过，滤液浓缩至5ml，作为供试品溶液。另取木香对照药材0.5g，加乙醚10ml，摇匀，放置过夜，滤过，滤液作为对照药材溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各5

μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷 - 丙酮(10:3)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1 %香草醛硫酸溶液，在120 ℃ 烘约5 分钟。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色斑点。处方小茴香 (盐炒)40g 八角茴香40g 橘核 (盐炒)40g 荔枝核 80g补骨脂 (盐炒)20g 肉桂 16g 川楝子 80g 延胡索 (醋制)40g 莪术 (醋制) 20g 木香 20g 香附 (醋制)40g 青皮 (醋炒) 40g 昆布 40g 槟榔 40g 乳香 (制) 20g 桃仁 16g 穿山甲 (制) 20g 制法 以上十七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。用水泛丸，干燥，即得。检查 应符合丸剂项下有关的各项规定 (附录 A)。功能与主治 散寒行气，消肿止痛。用于寒疝，睾丸肿痛。用法与用量 口服，一次6 ~ 9g，一日2 次。规格每100 丸重6g 贮藏 密闭，防潮。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com