

外科学测试题及答案肠疾病 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/469/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c67_469845.htm 单项选择题（每题1

分，共48题）1、女性，50岁，腹部阵发性胀痛1天，呕吐为胃内容物，近3个月来有时腹胀，大便带粘液无脓血，查体，BP17/12kPa，P86次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块，质韧压痛，腹部透视见一个气液平面，白细胞 11×10^9 次方/L，血红蛋白87g/L.下列检查意义最大的是什么

【B】 A、X线钡餐透视 B、纤维结肠镜 C、腹部B超 D、腹部E、以上都不是 2、女性，50岁，腹部阵发性胀痛1天，呕吐为胃内容物，近3个月来有时腹胀，大便带粘液无脓血，查体，BP17/12kPa，P86次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块，质韧压痛，腹部透视见一个气液平面，白细胞 11×10^9 次方/L，血红蛋白87g/L.诊断首先考虑为【C】 A、阑尾周围脓肿 B、卵巢囊肿 C、结肠癌 D、回盲部结核 E、回盲部套叠

3、女性，50岁，腹部阵发性胀痛1天，呕吐为胃内容物，近3个月来有时腹胀，大便带粘液无脓血，查体，BP17/12kPa，P86次/分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块，质韧压痛，腹部透视见一个气液平面，白细胞 11×10^9 次方/L，血红蛋白87g/L.应采取的治疗措施为【C】 A、中药治疗 B、B超引导下穿刺 C、手术治疗 D、结肠充气复位 E、对症支持疗法

4、男性45岁，一周前因急性阑尾炎，进行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约200ml，查体：腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块，鸣

音弱，BP16/11kPa，P20次/分，白细胞， 12×10^9 次方/L中性80%。诊断首先应考虑为【C】 A、粘连性肠梗阻 B、绞窄性肠梗阻 C、麻痹性肠梗阻 D、小肠吻合口狭窄，梗阻 E、以上都不是

5、 男性45岁，一周前因急性阑尾炎，进行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约200ml，查体：腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块，鸣音弱，BP16/11kPa，P20次/分，白细胞， 12×10^9 次方/L中性80%。进一步检查首先应选择【A】 A、腹部X线平片 B、B超 C、CT D、钡剂灌肠 E、腹腔穿刺

6、 男性45岁，一周前因急性阑尾炎，进行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约200ml，查体：腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块，鸣音弱，BP16/11kPa，P20次/分，白细胞， 12×10^9 次方/L中性80%。应采取主要措施【B】 A、剖腹探查 B、支持疗法 C、腹腔灌洗 D、肠造口术 E、以上均不是

7、 急性坏死性肠炎【D】 A、持续性发热二、三周，突然右下腹部疼痛，出现弥漫性腹膜炎 B、发生于20岁左右，病史长，腹痛，腹泻无脓血，有低热，贫血，可出现肠梗阻 C、多发生于老年人，腹痛，腹胀，便秘与腹泻交替出现可出现不全肠梗阻 D、夏秋季多发，多见于儿童、青年，腥臭血便，全身中毒明显往往有休克 E、起病急，腹泻，血便或脓血便，腹痛在左下肢

8、 肠结核【B】 A、持续性发热二、三周，突然右下腹部疼痛，出现弥漫性腹膜炎 B、发生于20岁左右，病史长，腹痛，腹泻无脓血，有低热，贫血，可出现肠梗阻 C、多发生于老年人，腹痛，腹胀，便秘与腹泻交替出现可出现不

全肠梗阻 D、夏秋季多发，多见于儿童、青年，腥臭血便，全身中毒明显往往有休克 E、起病急，腹泻，血便或脓血便，腹痛在左下腹 9、肠伤寒穿孔【A】 A、持续性发热二、三周，突然右下腹部疼痛，出现弥漫性腹膜炎 B、发生于20岁左右，病史长，腹痛，腹泻无脓血，有低热，贫血，可出现肠梗阻 C、多发生于老年人，腹痛，腹胀，便秘与腹泻交替出现可出现不全肠梗阻 D、夏秋季多发，多见于儿童、青年，腥臭血便，全身中毒明显往往有休克 E、起病急，腹泻，血便或脓血便，腹痛在左下腹 10、结肠癌【A】 A、机械性肠梗阻 B、痉挛性肠梗阻 C、绞窄性肠梗阻 D、麻痹性肠梗阻 E、闭袢性肠梗阻 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com