

妇产科学测试题及答案孕期保健及监护 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E5_A6_87_E4_BA_A7_E7_A7_91_E5_c67_470043.htm 单项选择题（每题1分，共21题）

1、自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是【D】 A、骨盆入口前后径 B、产科结合径 C、真结合径 D、对角径（骶耻内径） E、中骨盆前后径

2、随着产前诊断的开展，由于产前诊断的需要（如遗传病的产前诊断等），第一次产前检查的时间，应从传统的孕20周提前到【E】 A、孕16周 B、孕12周 C、孕12周以内 D、孕10周 E、确诊为早孕时

3、OCT阳性是指在测试【D】 A、早期减速在10分钟内连续出现3次以上 B、胎心率基线变异在6次以下 C、无宫缩时10分钟内出现3次晚期减速 D、在10分钟内晚期减速连续出现3次以上，胎心率基线变异在5次以下 E、早期减速出现频率达50%以上

4、尿妊娠试验对下列哪项无诊断价值【B】 A、早期妊娠 B、过期流产 C、异位妊娠 D、先兆流产 E、葡萄胎

5、关于绒毛膜促性腺激素，下列哪项是错误的【B】 A、是由合体滋养叶细胞产生 B、是一种甾体激素 C、检测时可因与促黄体生成素有交叉反应而呈假阳性 D、妊娠8~10周时达高峰 E、葡萄胎妊娠在孕12周后hCG继续上升

6、关于中期妊娠的诊断与监护，下列哪项是错误的【A】 A、从孕早期至孕中期，胎动逐渐增多 B、从孕18~20周起孕妇自觉胎动 C、孕20周左右利用听诊即可听到胎心音 D、孕20周可经腹壁触及宫内胎体 E、孕22周起胎头双顶径每周增加约0.22cm

7、关于骨盆径线，下述哪项错误【C】 A、髂棘间径是两髂前上棘外缘间的距离 B、骶耻外径 C、坐骨结节间径 D、对角径长度减去1.5

~ 2cm，即为骨盆入口前后径长度 E、粗隆间径可间接推测中骨盆横径长度 8、下列哪项不属于胎盘功能检查【C】 A、孕妇尿中雌三醇值 B、催产素激惹试验 C、孕妇尿中 -hCG值 D、孕妇血清胎盘生乳素值 E、孕妇血清催产素酶值 9、女性，28岁。G1P0，末次月经是1994年4月25日，预产期应是【C】 A、1995年1月2日 B、1995年2月11日 C、1995年2月1日 D、1995年3月21日 E、1995年1月30日 10、女性，28岁。孕36周，产前检查胎背位于母体腹部左侧，胎心位于左上腹，宫底可触及浮球感，诊断胎方位为【D】 A、LOA B、LOT C、RSA D、LSA E、LOP 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com