

中国药典2000版一部：化症回生片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_470050.htm 中药名称化症回生片拼音名Huazheng Huisheng Pian性状本品为棕黄色片；具麝香气，味微苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：体壁碎片黄棕色，毛窝呈双圈状，有时可见针头状突起。花粉粒黄棕色呈类圆形，直径约至30 μm,外壁具细点状。花粉粒呈三角形，直径约至16 μm。纤维束红棕色，纤维细，直径8~10 μm。含糊化淀粉粒的薄壁细胞碎片淡黄绿色。表皮细胞黄棕色，表面观呈多角形，壁稍增厚。非腺毛2~7个细胞，胞腔含棕色物质。淀粉粒呈棒槌形或瓶形，长约50 μm,层纹隐约可见。石细胞类方形，壁厚，有时一边菲薄。草酸钙簇晶甚大，直径80~140 μm。无定形团块淡黄棕色，包埋有细小方形结晶。花粉粒呈圆形或椭圆形，直径64~80 μm,外壁呈刺状，有萌发孔三个。(2)取本品2片，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，取滤液5ml,蒸干，残渣加水10ml使溶解，加盐酸1ml,置水浴上加热30分钟，放冷，用乙醚振摇提取2次，每次20ml，合并乙醚液，蒸干，残渣加氯仿2ml使溶解，作为供试品溶液。另取大黄对照药材0.1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述两种溶液各4 μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干。置紫外光灯(365nm)下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的五个橙黄色斑点；置氨气中熏后，日

光下检视，斑点变为红色。(3) 取本品20片，研细，加80%乙醇50ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加1%盐酸溶液5ml使溶解，滤过，滤液滴加碳酸钠试液调节pH值至8.0，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取益母草对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照纸色谱法(附录 A)试验，吸取上述两种溶液各20 μ l，分别点于同一层析滤纸上，使成条状，以正丁醇-醋酸-水(4:1:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液，晾干。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的条斑。处方益母草 112g 红花 14g 花椒(炭) 14g 水蛭(制) 14g 当归 28g 苏木 14g 三棱(醋炙) 14g 两头尖 14g 川芎 14g 降香 14g 香附(醋炙) 14g 人参 42g 高良姜 14g 姜黄 8.4g 没药(醋炙) 14g 苦杏仁(炒) 21g 大黄 56g 麝香 14g 小茴香(盐炒) 21g 桃仁 21g 五灵脂(醋炙) 14g 虻虫 14g 鳖甲胶 112g 丁香 21g 延胡索(醋炙) 14g 白芍 28g 蒲黄(炭) 14g 乳香(醋炙) 14g 干漆(煨) 14g 吴茱萸(甘草水炙) 14g 阿魏 14g 肉桂 14g 艾叶(炙) 14g 熟地黄 28g 紫苏子 14g 制法 以上三十五味，除麝香、阿魏、熟地黄、益母草、鳖甲胶外，其余三十味混匀，取出430g，粉碎成细粉，剩余部分和益母草用水煎煮二次，滤过，合并滤液，加入鳖甲胶，溶化后，浓缩成稠膏。阿魏用水加热溶化，熟地黄水煎取汁，分别滤过，合并滤液，浓缩成稠膏。两膏合并，加入细粉拌匀，干燥，研细，以乙醇制粒，干燥，再加入研细的麝香，混匀，压制成1000片，即得。检查 应符合片剂项下有关的各项规定(附录 D)。功能与主治 消化瘀。用于积血痹，妇女干血癆，产后瘀血，少腹疼痛拒按。用法与用量 饭前温酒送服，一次5~6片，一日2

次。注意 孕妇禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com