

外科学测试题及答案泌尿男性生殖系统结核 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c67_470201.htm 单项选择题（每题1分，共40题）

- 1、一侧无功能结核肾脏，对侧轻度肾积水，膀胱容量正常，处理方法是【C】
A、积水侧肾造瘘 B、暂保守治疗 C、切除结核无功能肾，观察积水肾进展情况，再决定是否行输尿管膀胱再植 D、切除仍保留无功能肾3~6个月后进行积水侧肾造瘘 E、切除无功能肾3~6个月行积水侧输尿管膀胱再植术
- 2、一侧肾下盏结核，充分抗结核治疗后最好的治疗方法【B】
A、病灶清除术 B、肾部分切除术 C、肾切除术 D、保守治疗抗结核药物应用 E、根治性肾切除术
- 3、泌尿男性生殖器结核原发灶多在【A】
A、肾 B、输尿管 C、膀胱 D、附睾 E、前列腺
- 4、肾结核的原发灶多在【D】
A、骨关节 B、淋巴结 C、肠道 D、肺 E、腹腔
- 5、肾结核早期唯一严重的阳性发现是【D】
A、大量血尿 B、肾区包块 C、结核中毒症状 D、尿常规有少量红细胞和脓细胞 E、肾盂造影有破坏病灶
- 6、肾结核X线检查主要靠【C】
A、腹部平片 B、肾动脉造影 C、肾盂造影 D、肾断层造影 E、后腹膜充气造影
- 7、肾结核单纯使用抗结核药物指征是【C】
A、静脉肾盂造影一侧不显影 B、静脉肾盂造影一侧广泛破坏 C、肾盂造影显示病变轻 D、一侧肾钙化 E、肾结核并结核性挛缩膀胱
- 8、位于肾实质表浅不与肾盏肾盂相通的结核病灶，理想的治疗是【E】
A、抗结核药物治疗 B、病灶清除术 C、患肾切除术 D、患肾部分切除术 E、抗结核治疗3~6个月，无效时病灶清除术
- 9、确定肾结核下列哪项最可靠【E】
A、尿中查到红白

细胞 B、附睾有硬结 C、肺结核同时伴膀胱刺激症状 D、膀胱镜检查可见膀胱内充血水肿 E、肾盂造影片可见肾盏虫蚀样破坏

10、肾结核肾切除指征，哪项不对【E】

A、单肾结核，对侧肾功能正常，肾脏破坏严重且广泛 B、双肾结核，轻侧能担负起肾功能，严重侧切除 C、一侧肾结核对侧肾积水，但肾功能正常可切除病肾 D、一侧肾结核合并膀胱挛缩对侧无积水可切除病肾 E、一侧肾结核对侧肾正常，即使病变轻也可做病肾切除

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com