

外科学测试题及答案手外伤及断肢（指）再植 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c67_470635.htm 单项选择题（每题1分，共44题）

1、手的肌腱断裂后，出现的体征是【D】 A、手指，被动活动丧失 B、局部出现剧烈的疼痛 C、出现手的成角畸形 D、手的休息位发生改变 E、出现侧方摆动

2、单纯指深屈肌腱断裂后，临床可发生【E】 A、手指过伸畸形 B、手指出现垂状指 C、手指的伸，屈功能丧失 D、手指屈曲功能丧失 E、手指远位指间关节屈曲功能丧失

3、Allen试验是用于检查手的【B】 A、感觉情况 B、供血情况 C、运动情况 D、发汗情况 E、皮温情况

4、手外伤后创口出血，在转送途中，首先采用的止血方法是【D】 A、手压法 B、患肢抬高 C、缚止血带 D、局部加压包扎 E、钳夹止血

5、手外伤清洗创口的具体步骤是【E】 A、用0.1%的新洁尔灭冲洗创口 B、用生理盐水冲洗创口后冲创口周围 C、先用碘酒，酒精消毒，再清洗创口 D、用0.1%的新洁尔灭冲洗伤口内外 E、先用肥皂水刷洗创口周围皮肤，再用生理盐水洗净创口周围，最后再冲洗创口

6、右手环指远端缺损骨外露，下列哪种方法不适采用【B】 A、缩短指骨，缝合皮肤 B、中厚皮片植皮 C、带蒂皮瓣移植 D、推进皮瓣移植 E、鱼际皮瓣转位

7、带蒂皮瓣移植术，适用于下列哪种类型的手外伤【A】 A、手部有肌腱骨外露及皮肤缺损者 B、手部皮肤浅度烧伤 C、手部感染者 D、手部骨折 E、手部皮肤单纯缺损

8、关于手部皮肤切割伤的处理，下列哪项不正确【C】 A、清创术，应在伤后6~8小时内进行 B、最好在止血带下进行清创 C、切除皮缘宁多勿

少，以防感染 D、创口应力争一期闭合 E、伤后超过24小时，可行二期处理 9、鼻咽窝的深部组织，是【C】 A、第一掌指关节 B、大多角骨 C、腕舟骨 D、桡侧伸腕肌止点 E、外展拇短肌止点 10、屈指肌腱损伤，修复后提倡【B】 A、固定三周后，逐渐练习功能 B、保护性被动活动 C、固定四周后，开始活动 D、术后即开始功能练习 E、固定二周，开始功能练习 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com