

中国药典2000版一部：桂附地黄丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_470640.htm 中药名称桂附地黄丸拼音名Guifu Dihuang Wan性状本品为黑棕色的水蜜丸、黑褐色的小蜜丸或大蜜丸；味甜而带酸辛。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：淀粉粒三角状卵形或矩圆形，直径24~40 μm,脐点短缝状或人字状。糊化淀粉粒团块类白色。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4~6 μm,薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。草酸钙簇晶存在于无色薄壁细胞中，有时数个排列成行。果皮表皮细胞橙黄色，表面观类多角形，垂周壁略呈连珠状增厚。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。石细胞类方形或类圆形，壁一边菲薄。(2)取本品小蜜丸或大蜜丸9g、水蜜丸6g，剪碎，加乙醚15ml，振摇15分钟，放置1小时，滤过，滤液挥去乙醚，残渣加丙酮1ml使溶解，作为供试品溶液。另取丹皮酚对照品，加丙酮制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各10 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上使成条状，以环己烷-醋酸乙酯(3:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以盐酸酸性5%三氯化铁乙醇溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的蓝褐色条斑。(3)取本品小蜜丸或大蜜丸9g、水蜜丸6g，剪碎，加乙醇10ml，振摇15分钟，放置1小时，滤过，作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加乙醇制成每1ml含1 μl的溶液，作为对照品溶液。照薄层色

谱法（附录 B）试验，吸取上述供试品溶液15 μl、对照品溶液 2 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（30 ~ 60）- 醋酸乙酯(17:3) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 0.1%2,4-二硝基苯肼溶液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙红色斑点。处方肉桂 20g 附子（制）20g 熟地黄160g 山茱萸（制）80g牡丹皮60g 山药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g制法 以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g 粉末加炼蜜35 ~ 50g 与适量的水，泛丸，干燥；或加炼蜜80 ~ 110g制成小蜜丸或大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。用法与用量口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。规格大蜜丸每丸重9g贮藏密封。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com