

中国药典2000版一部：马钱子散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_471728.htm

中药名称马钱子散
拼音名Maqianzi San性状本品为黄棕色的粉末；气微，味苦。
鉴别 取本品1g，加浓氨试液数滴及氯仿10ml，浸泡数小时，滤过，取滤液1ml蒸干，残渣加稀盐酸1ml使溶解，加碘化铋钾试液1~2滴即生成黄棕色沉淀。处方马钱子（沙烫）适量（含土的宁8.0g）地龙（去土焙黄）93.5g制法 以上二味，将制马钱子、地龙分别粉碎成细粉，配研，过筛，即得。检查应符合散剂项下有关的各项规定（附录 B）。含量测定 取本品0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入氯仿20ml，浓氨试液1ml，轻轻摇匀，称定重量后，于室温放置24小时，再称重，补足失去氯仿量，充分振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。另取土的宁对照品，加氯仿制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，分别吸取供试品溶液8 μ l和对照品溶液4 μ l，交叉点于同一硅胶G F 254薄层板上，以甲苯-丙酮-乙醇-浓氨试液(8:6:0.5:2)的上清液为展开剂，展开，取出，晾干。照薄层色谱法（附录 B薄层扫描法）进行扫描，波长：S=257nm，R=300nm，测量供试品与对照品吸收度积分值，计算，即得。本品每袋含土的宁(C₂₁H₂₂N₂O₂)应为7.2~8.8mg。功能与主治 祛风湿，通经络。用于因风、寒、湿引起的臂痛腰痛，周身疼痛，及肢体萎缩。用法与用量 每晚用黄酒或开水送服。一次0.2g，如无反应，可增至0.4g，最大剂量不超过0.6g。老幼及体弱者酌减。注意 本品含毒剧药，不可多服。服药后

约 1小时可能出现汗出周身，发痒，哆嗦等反应，反应严重者可请医生处理。十三岁以下儿童、孕妇及身体虚弱者，心脏病、严重气管炎、单纯性高血压患者禁服。忌食生冷食物。规格每袋装0.6g贮藏密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com