

中国药典2000版一部：抗感颗粒（冲剂）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_472257.htm 中药名称抗感颗粒（冲剂）拼音名Kanggan Keli性状本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。鉴别 取本品4g，研细，加醋酸乙酯15ml，置水浴上回流提取1小时，放冷，滤过，滤液蒸干。残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取绿原酸对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液10 μ l、对照品溶液2 μ l，分别点于同一以羟甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以醋酸丁酯 - 甲酸 - 水(7:2.5:2.5)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。处方金银花 210g 赤芍 210g 绵马贯众 70g制法 以上三味，加水煎煮二次，每次1.5小时，合并滤液，滤过，滤液浓缩至250ml，加乙醇至含醇量50%，搅匀，放置过夜，滤过，滤液回收乙醇，并浓缩至相对密度为1.28~1.30(50 $^{\circ}$ C)的清膏。取清膏1份，蔗糖粉1.65份，糊精1.5份及乙醇适量，制成颗粒，干燥，即得。检查 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（附录 C）。功能与主治 清热解毒。用于外感风热引起的发热，头痛，鼻塞，喷嚏，咽痛，全身乏力，酸痛等症。用法与用量 开水冲服，一次10g，一日3次，小儿酌减或遵医嘱。注意 孕妇慎服。规格 每袋装10g贮藏 密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com