

中国药典2000版一部：小儿清热止咳口服液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_472878.htm

中药名称小儿清热止咳口服液拼音名Xiaoer Qingre Zhike koufuye性状本品为棕黄色的液体，久置有少量沉淀；味甘、微苦。鉴别(1)取本品5ml,加乙醇15ml，置水浴上回流30分钟，滤过，取滤液1ml,加镁粉少许及盐酸4~5滴，加热，溶液即显红色。(2)取本品20ml，加浓氨试液1ml,用乙醚振摇提取二次，每次20ml，合并乙醚提取液，加盐酸乙醇溶液(1:20)1ml，摇匀，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-浓氨试液(20:3.5:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105 $^{\circ}$ C烘约10分钟。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的红色斑点。处方麻黄90g苦杏仁(炒)120g石膏270g甘草90g黄芩180g板蓝根180g北豆根90g制法以上七味，麻黄、石膏加水煎煮半小时，再加入苦杏仁等五味，煎煮二次，第一次2小时，第二次1小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至约600ml,静置24小时，滤过，滤液加蜂蜜200g，蔗糖100g及苯甲酸钠3g，煮沸使溶解，加水至总量1000ml，搅匀，冷藏24~48小时，滤过，灌封，灭菌，即得。检查相对密度应不低于1.04(附录A)。pH值应为3.5~5.5(附录G)。其他应符合合剂项下有关的各项规定(附录J)。功能与主治清热，宣肺，平喘。用于小儿

外感引起：发热恶寒，咳嗽痰黄，气促喘息，口干音哑，咽喉肿痛，乳蛾红肿。用法与用量口服，一至二岁每次服3~5ml，三至五岁每次服5~10ml，六至十四岁每次服10~15ml，一日3次。用时摇匀。规格每支10ml贮藏密封。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com