

中国药典2000版一部：威灵仙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_472932.htm 中药名称威灵仙拼音名Weilingxian英文名RAIX CLEMATIDIS来源本品为毛茛科植物威灵仙*Clematis chinensis* Osbeck、棉团铁线莲*Clematis hexapetala* Pall. 或东北铁线莲*Clematis manshurica* Rupr. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒干。性状威灵仙根茎呈柱状，长1.5~10cm，直径0.3~1.5cm，表面淡棕黄色，顶端残留茎基，质较坚韧，断面纤维性，下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长7~15cm，直径0.1~0.3cm；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部。质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。棉团铁线莲根茎呈短柱状，长1~4cm，直径0.5~1cm。根长4~20cm，直径0.1~0.2cm；表面棕褐色至棕黑色，断面木部圆形。味咸。东北铁线莲根茎呈柱状，长1~11cm，直径0.5~2.5cm。根较密集，长5~23cm，直径0.1~0.4cm；表面棕黑色，断面木部近圆形。味辛辣。鉴别本品根的横切面：威灵仙表皮细胞外壁增厚，棕黑色。皮层宽，均为薄壁细胞，外皮层切向延长；内皮层明显。韧皮部外侧常有纤维束及石细胞，纤维直径18~43 μ m。形成层明显。木质部全部木化。薄壁细胞含淀粉粒。棉团铁线莲外皮层细胞多径向延长，紧接外皮层的1~2列细胞壁稍增厚；韧皮部外侧无纤维束及石细胞。东北铁线莲外皮层细胞径向延长，老根略切向延长；韧皮部外侧偶有纤维及石细胞；纤维直径20~32 μ m。炮制除去杂质，洗净，润透

，切段，干燥。检查总灰分不得过10.0%（附录 K）。【浸出物】照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录 A）测定，用乙醇作溶剂，不得少于15.0%。性味与归经 辛、咸，温。归膀胱经。功能与主治 祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。用法与用量6~9g。贮藏置干燥处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com