

儿科学试题临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/473/2021_2022__E5_84_BF_E7_A7_91_E5_AD_A6_E8_c67_473079.htm 单项选择：1、肺动脉瓣区第二音亢进和固定分裂多见于 A、房间隔缺损 B、室间隔缺损 C、动脉导管未闭 D、法洛四联症 E、肺动脉瓣狭窄

2、患儿腹泻4天，中度脱水。经2天补液后脱水基本纠正，但仍肢软，心音稍钝，进食甚少。在整个补液治疗过程中对补钾按以下方案进行。但哪一项是错误的 A、治疗时注意到给钾前6小时曾排尿 B、静脉钾盐点滴浓度不超过0.3% C、滴注时间不少于6~8小时 D、脱水纠正后第二天停止补钾 E、补钾量一般为3~4mmol/(kg.d)

3、10月患儿，已在当地医院诊断为佝偻病活动期，给予治疗，效果不好，为进一步判定诊断是否正确，不需要做下列哪些检查 医学教育网收集整理 A、腕部X线摄片 B、测血清，钙，磷 C、血常规 D、体格检查 E、骨密度

4、激素治疗8周，尿蛋白减少至~ A、激素敏感 B、激素部分敏感 C、激素耐药 D、激素依赖 E、激素高度敏感

5、女婴，10个月。腹泻每日5~7次，水样便。伴呕吐2次。每日尿量较平日略少些。体检：前囟平，哭有泪。口唇略干，四肢温暖，无腹胀。皮肤弹性尚可。该儿腹泻病情为轻型与重型的区别点主要是 A、有无发热呕吐 B、每日大便>10次以上为重型 C、有无水、电解质紊乱 D、大便含粘液、血性为重型 E、镜检有大量脂肪滴为重型

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com