

中国药典2000版一部：草果 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/473/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_473512.htm 中药名称草果拼音名Caoguo英文名FRUCTUS TSAOKO来源本品为姜科植物草果Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干或低温干燥。性状本品呈长椭圆形，具三钝棱，长2~4cm，直径1~2.5cm。表面灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有圆形突起的柱基，基部有果梗或果梗痕。果皮质坚韧，易纵向撕裂。剥去外皮，中间有黄棕色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子多为8~11粒。种子呈圆锥状多面体，直径约5mm。表面红棕色，外被灰白色膜质的假种皮，种脊为1条纵沟，尖端有凹状的种脐；质硬，胚乳灰白色。有特异香气，味辛、微苦。鉴别(1)本品种子横切面：假种皮薄壁细胞含淀粉粒。种皮表皮细胞棕色，长方形，壁较厚；下皮为1列薄壁细胞，含黄色物；油细胞层为1列油细胞，类方形或长方形，切向42~162μm，径向48~68μm，含黄色油滴；色素层为数列棕色细胞，皱缩。内种皮为1列栅状石细胞，棕红色，内壁与侧壁极厚，胞腔小，内含硅质块。外胚乳细胞含淀粉粒及少数细小草酸钙簇晶及方晶。内胚乳细胞含糊粉粒及淀粉粒。炮制草果仁取草果，照清炒法（附录 D）炒至焦黄色并微鼓起，去壳，取仁。用时捣碎。姜草果仁取净草果仁，照姜汁炙法（附录 D）炒干。用时捣碎。含量测定照挥发油测定法（附录 D）测定。本品种子团含挥发油不得少于1.4%(ml/g)。性味与归经辛、温。归脾、胃经。功能与主治燥湿温中，除痰截

疔。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热。用法与用量3～6g。贮藏置阴凉干燥处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com