

中国药典2000版一部：八珍益母丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_474100.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474100.htm) 中药名称八珍益母丸拼音名Bazhen Yimu Wan性状本品为棕黑色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸；微有香气，味甜而微苦。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4~6 μm。联结乳管直径12~15 μm，含细小颗粒状物。非腺毛1~3细胞，稍弯曲，壁有疣状突起。草酸钙针晶细小，长10~32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径18~32 μm，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含有数个簇晶。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。(2)取本品大蜜丸或小蜜丸或大蜜丸9g，切碎，加硅藻土5g，研匀，或取水蜜丸6g研碎，加乙醇40ml浸渍1小时，时时振摇，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇提取3次，每次20ml，合并正丁醇提取液，用水洗3次，弃去水液，正丁醇液蒸干，残渣加乙醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取芍药甙对照品，加乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验，吸取上述两种溶液各3 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-甲酸(40:5:10:0.2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(3)取本品大

蜜丸或大蜜丸27g，切碎，加硅藻土10g，研匀；或取水蜜丸18g，研碎，加0.5%盐酸乙醇溶液70ml，超声处理30分钟，滤过，滤液浓缩至稠膏状，加1%盐酸溶液3ml使溶解，滤过，滤液加20%磷酸钙溶液2ml，混匀，离心，弃去上清液，沉淀用水1~2ml移至蒸发皿中，加无水碳酸钠1g，搅拌均匀，置水浴上蒸干，用0.5%盐酸乙醇溶液研磨提取3次，每次2ml，滤过，合并滤液，蒸干，残渣加0.5%盐酸乙醇溶液0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸水苏碱对照品，加乙醇制成每1ml含5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取供试品溶液10 $\mu$ l、对照品溶液5 $\mu$ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以正丁醇-盐酸-水(8:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方益母草 200g 党参 50g 白术（炒） 50g 茯苓 50g 甘草 25g 当归 100g 白芍（酒炒） 50g 川芎 50g 熟地黄 100g 制法 以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜40~50g与适量的水，泛丸，干燥；或加炼蜜 120~140g制成小蜜丸或大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 补气血，调月经。用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。用法与用量 口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2次。规格大蜜丸每丸重9g贮藏密封。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)