

中国药典2000版二部：注射用环磷酰胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_474882.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474882.htm) 药品名称注射用环

磷酰胺拼音名Zhusheyong Huanlinxian ' an英文

名CYCLOPHOSPHAMID FOR INJECTION来源(分子式)与标准本品为环磷酰胺的灭菌结晶。按平均装量计算，

含 $C_7H_{15}Cl_2N_2O_2P \cdot H_2O$  应为标示量的95.0 ~ 105.0 %。性状

本品为白色结晶或结晶性粉末。检查 氯化物 取本品1瓶，加水溶解使成10ml，迅速加稀硝酸10ml和硝酸银试液1ml，摇

匀，依法检查（附录 A），立即与标准氯化钠溶液1.8ml（取样0.1g）或3.6ml（取样0.2g）制成的对照液（加水使

成10ml，加稀硝酸10ml和硝酸银试液1ml, 摇匀，在暗处放置5分钟）比较，不得更浓（0.018 %）。酸度、水分照环磷酰

胺项下的方法检查，均应符合规定。无菌 取本品2瓶，分别加灭菌水制成每1ml中含20mg的溶液，依法检查（附录 H

），应符合规定。其他 应符合注射剂项下有关的各项规定（附录 B）。鉴别 照环磷酰胺项下的鉴别试验，显相同的结果。

含量测定 取装量差异项下的内容物，照环磷酰胺项下的方法测定，即得。类别同环磷酰胺。剂量临用前，加氯化钠

注射液使溶解后，立即注射。静脉注射 一次0.2g 一日或隔日1次 或一次0.6 ~ 0.8g 一周1次 一疗程总量8 ~ 10g注意同环

磷酰胺。规格(1) 0.1g (2) 0.2g贮藏遮光，密闭，在30 以下保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)