

中国药典2000版二部：注射用苯巴比妥钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474884.htm 药品名称注射用苯巴比妥钠拼音名Zhusheyong Benbabituona英文

名PHENOBARBITAL SODIUM FOR INJECTION来源(分子式)与标准本品为苯巴比妥钠的灭菌结晶或粉末。按平均装量计算，含苯巴比妥钠($C_{12}H_{11}N_2NaO_3$)应为标示量的93.0 ~ 107.0 %。性状 本品为白色结晶性颗粒或粉末。检查 碱度 照苯巴比妥钠项下的方法检查，应符合规定。干燥失重 取本品，在150 干燥至恒重，减失重量不得过7.0 % (附录 L)。无菌 取本品2 瓶，分别加灭菌水制成每1ml 中含50mg的溶液，依法检查 (附录 H)，应符合规定。其他 应符合注射剂项下有关的各项规定 (附录 B)。鉴别 照苯巴比妥钠项下的鉴别试验，显相同的结果。含量测定 取装量差异项下的内容物，照苯巴比妥项下的方法测定，按干燥品计算，含 $C_{12}H_{11}N_2NaO_3$ 不得少于98.5%；再按平均装量计算。每1ml 的硝酸银滴定液 (0.1mol/L)相当于25.42mg 的 $C_{12}H_{11}N_2NaO_3$ 。类别同苯巴比妥钠。剂量临用前，加灭菌注射用水适量使溶解。常用量 皮下、肌肉或缓慢静脉注射一次0.1 ~ 0.2g 一日1 ~ 2 次 极量 皮下、肌肉或缓慢静脉注射一次0.25g 一日0.5g注意可致依赖性。严重肝、肾功能不全及肝硬变患者禁用。规格(1) 50mg (2) 100mg (3) 200mg贮藏遮光，密闭保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com