

重酒石酸间羟胺注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E9_87_8D_E9_85_92_E7_9F_B3_E9_c67_474886.htm 药品名称重酒石酸间羟胺注射液拼音名Chongjiushisuan Jianqiang ' an Zhusheye英文名METARAMINOL BITARTRATE INJECTION来源(分子式)与标准本品为重酒石酸间羟胺的灭菌水溶液。含间羟胺(C₉H₁₃NO₂) 应为标示量的93.0 ~ 107.0 %。性状本品为无色的澄明液体。检查 pH值 应为3.0 ~ 4.0 (附录 H)。其他应符合注射剂项下有关的各项规定 (附录 B)。鉴别取本品1ml，加亚硝基铁氰化钠试液2滴、丙酮2滴与碳酸氢钠0.2g，在60℃的水浴中加热1分钟，即显红紫色。含量测定精密量取本品5ml (约相当于间羟胺50mg)，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，照分光光度法 (附录 A)，在272nm的波长处测定吸收度，按C₉H₁₃NO₂的吸收系数 (E_{1cm} 1%) 为111计算，即得。类别同重酒石酸间羟胺。剂量常用量肌肉注射 一次10 ~ 20mg 静脉滴注 一次10 ~ 40mg，稀释后缓缓滴注，根据病情调整滴速及用量。极量静脉滴注 一次100mg (每分钟0.2 ~ 0.4mg) 注意心脏病、甲状腺功能亢进、糖尿病和高血压病患者慎用。规格(1) 1ml:10mg间羟胺 (相当于重酒石酸间羟胺19mg) (2) 5ml:50mg间羟胺 (相当于重酒石酸间羟胺95mg) 贮藏遮光，密闭保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com