

中国药典2000版二部：山梨醇注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_474889.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474889.htm) 药品名称山梨醇注射液拼音名Shanlichun Zhusheye英文名SORBITOL INJECTION 来源(分子式)与标准本品为山梨醇的灭菌水溶液。含山梨醇( $C_6H_{14}O_6$ ) 应为标示量的95.0% ~ 105.0%。性状 本品为无色的澄明液体。检查 pH值 应为4.5 ~ 6.5 (附录 H)。不溶性微粒 取本品1瓶，依法检查(附录 C)，应符合规定。热原 取本品，依法检查(附录 D)，剂量按家兔体重每1kg 注射10ml，应符合规定。其他 应符合注射剂项下有关的规定(附录 B)。鉴别(1) 取本品20ml，置水浴上加热浓缩至约10ml，放冷，照山梨醇项下的鉴别(1)项试验，显相同的结果。(2) 取本品0.2ml，用水稀释成3ml，照山梨醇项下的鉴别(2)项试验，应显相同的反应。含量测定 精密量取本品10ml (约相当于山梨醇2.5g)，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀；精密量取10ml，置250ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，照山梨醇项下的方法，自“精密量取10ml，置碘瓶中”起，依法测定。每1ml的硫代硫酸钠滴定液(0.05mol/L) 相当于0.9109mg的 $C_6H_{14}O_6$ 。类别同山梨醇。剂量静脉滴注 一次250 ~ 500ml 30分钟内滴入 小儿每次每公斤体重1 ~ 2g。注意心功能不全患者慎用。规格(1) 100ml:25g (2) 250ml:62.5g贮藏遮光，密闭保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)