

中国药典2000版二部：注射用硫酸长春新碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/490/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_490571.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/490/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_490571.htm) 药品名称注射用硫酸长春新碱拼音名Zhusheyong Liusuan Changchunxinjian英文名VINCRISTINE SULFATE FOR INJECTION来源(分子式)与标准本品为硫酸长春新碱的无菌冻干品。含硫酸长春新碱(C<sub>46</sub>H<sub>56</sub>N<sub>4</sub>O<sub>10</sub>.H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)应为标示量的90.0~110.0%。性状本品为白色或类白色的疏松状或无定形固体；有引湿性；遇光或热易变黄。检查酸度取本品1瓶，加水5ml溶解后，依法测定(附录 H)，pH值应为4.0~6.5。含量均匀度以含量测定项下测得的每瓶含量计算，应符合规定(附录 E)。

无菌取本品2瓶，分别加灭菌水制成每1ml中含0.1mg的溶液，依法检查(附录 H)，应符合规定。其他应符合注射剂项下有关的各项规定(附录 B)。鉴别取本品，照硫酸长春新碱项下的鉴别试验，显相同的结果。含量测定取本品10瓶，分别加甲醇1ml使内容物溶解，并转置于50ml量瓶中，用甲醇多次洗涤容器，洗液并入量瓶中并稀释至刻度，摇匀，照硫酸长春新碱项下的方法自“照分光光度法附录 A)”起测定，计算每瓶的含量，并求得10瓶的平均含量，即得。类别同硫酸长春新碱。剂量临用前，加氯化钠注射液适量使溶解。静脉注射一次1~2mg一周1次一疗程总量6~10mg注意用药期间应严格检查血象。注射时防止药液漏出血管外。规格1mg贮藏遮光，密闭，在冷处保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)