

中国药典2000版二部：盐酸林可霉素片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/491/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_491642.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/491/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_491642.htm) 药品名称盐酸林可霉素片拼音名Yansuan Linkemeisu Pian英文名LINCOMYCINE HYDROCHLORIDE TABLETS来源(分子式)与标准本品含盐酸林可霉素按林可霉素( $C_{18}H_{34}N_2O_6S$ )计算，应为标示量的90.0~110.0%。性状本品为白色片或糖衣片；糖衣片除去包衣后显白色。检查林可霉素B照含量测定项下的高效液相色谱条件试验，林可霉素B的峰面积不得超过林可霉素与林可霉素B峰面积之和的5.0%。其他应符合片剂项下有关的各项规定（附录A）。鉴别取本品的细粉与盐酸林可霉素对照品，分别加流动相制成每1ml中含10mg的溶液；照含量测定项下的高效液相色谱条件试验，供试品与对照品主峰的保留时间应一致。含量测定取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量〔约相当于盐酸林可霉素0.25g（活性）〕，如为糖衣片，取4片，全部研细，用80%乙醇溶解并稀释成每1ml中约含10mg的溶液，静置，精密量取上清液2ml，和内标溶液（照盐酸林可霉素项下制备）1ml，置10ml量瓶，用流动相稀释至刻度，摇匀，用 $0.45\mu m$ 微孔滤膜滤过，作为供试品溶液，取 $10\mu l$ 注入液相色谱仪，照盐酸林可霉素项下的方法测定，即得。类别同盐酸林可霉素。剂量同盐酸林可霉素。注意同盐酸林可霉素。规格(1) 0.25g（活性）(2) 0.5g（活性）贮藏密封保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)