

口腔内科学学习题及答案（A2型题3）执业医师资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/507/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E5\\_86\\_85\\_E7\\_c22\\_507552.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_86_85_E7_c22_507552.htm)

一、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 6岁女孩主诉新牙歪斜。查：两上中切牙萌出2/3，向远中倾斜，中间2mm间隙。下列哪项是错误的

A. 侧切牙牙胚挤压中切牙牙根形成间隙  
B. 多生牙，牙瘤的存在导致  
C. 唇系带附着过低形成间隙  
D. 侧切牙先天缺失使中切牙出现间隙  
E. 吮指习惯可使前牙出现间隙

正确答案：D

2. 患儿3岁，胆小腼腆。前牙开合，有散在间隙。此患儿有吮指不良习惯。现阶段较好的处理是

A. 不做处理，观察  
B. 手指涂抹药物以去除不良习惯  
C. 固定矫治器矫治  
D. 采取合适的护理和心理疏导方法  
E. 严厉管教，杜绝不良习惯

正确答案：D

3. 患儿10岁，前牙冷刺激疼数日。检查：右上中切牙近中深龋洞，叩诊无异常，不松动，冷测一过性痛。处理：去腐干净极近髓，敏感。选何种治疗方法

A. 二次去腐  
B. 氧化锌丁香油糊剂间接盖髓  
C. 氢氧化钙间接盖髓  
D. 直接盖髓  
E. 活髓切断

正确答案：B

4. 患儿8岁，右上中切牙远中深龋洞，叩诊无异常，牙龈正常。不松动。处理：去腐干净，深，近髓。哪种治疗方法较好

A. 氧化锌丁香油糊剂间接盖髓  
B. 二次去腐  
C. 活髓切断  
D. 根尖诱导成形术  
E. 间接盖髓

正确答案：E

5. 患儿9岁，左上侧切牙牙齿变色就诊。检查：冠折牙本质暴露，牙齿变色。冷热测无反应，x线片示根尖喇叭口，骨硬板不连续，下

列各项中哪项最重要 A . 拔髓 , 不要出根尖孔 B . 彻底去除根管内感染物质 , 消除炎症 , 保护牙乳头 C . 根管内不要封FC等刺激性大的药物 D . 用氢氧化钙糊剂充填不要超填 E . 定期复查更换糊剂 正确答案 : B

6 . 男性 , 27岁 , 主诉 : 牙龈疼痛、出血、口腔腐臭 , 不敢刷牙3天 , 无发热。该患者牙龈疼痛最可能的原因是 A . 口腔溃疡 B . 牙龈坏死 C . 口腔疱疹 D . 更换牙刷 E . 牙龈炎症 正确答案 : B

7 . 男性 , 30岁 , 主诉 : 牙龈自动出血。疼痛3天余 , 并伴有低热、该患者最可能的诊断是 A . 牙间乳头炎 B . 肥大性龈炎 C . 急性坏死性龈炎 D . 疱疹性龈口炎 E . 青少年牙周炎 正确答案 : C

8 . 女 , 26岁 , 戴固定矫正器半年余 , 近2个月觉刷牙牙龈出血 , 龈乳头呈球状增生 , 质地松软。最有可能的诊断是 A . 青春期龈炎 B . 增生性龈炎 C . 牙龈增生 D . 边缘性龈炎 E . 青少年牙周炎 正确答案 : B

9 . 16岁女孩 , 前牙牙列不齐、拥挤、前牙唇侧牙间乳头呈球状突起 , 质地松软光亮 , 有少量菌斑等。此患者最有可能的诊断是 A . 牙龈纤维瘤病 B . 妊娠期龈炎 C . 药物性牙龈增生 D . 青春期龈炎 E . 白血病 正确答案 : D

10 . 女 , 19岁 , 主诉 : 近1年来前牙松动、牙间隙增大。初中时就开始出现刷牙牙龈出血 , 偶有牙龈肿痛史。采集病史时 , 该病人应重点询问一下病史 , 除外 A . 家族史 B . 吸烟史来源 : 考试大 C . 妊娠史 D . 长期服用药物史 E . 口腔卫生习惯 正确答案 : A

11 . 女 , 28岁 , 主诉 : 下前牙舌侧牙龈长一肿瘤3个月 , 并慢慢增大 , 影响进食。该患者如果诊断为妊娠瘤 , 需切除时 , 应注意以下因素 , 除外 A . 牙龈炎症 B . 妊娠的时间 C . 妊娠期是否服药 D . 口腔卫生情况 E . 手术方法的选择 ( 激光等 ) 正确答案 : C

12 . 男 , 21岁 , 上唇短

，临床检查：上前牙唇侧牙龈边缘及龈乳头增生肥大，覆盖牙冠的1/3，质地较韧。最可能的诊断是 A．肥大性龈炎 B．边缘性龈炎 C．急性坏死性龈炎 D．药物性牙龈增生 E．牙龈纤维瘤病 正确答案：A

13．女，27岁，主诉：近2个月来，发现全口牙龈普遍增生。临床：全口牙龈增生肥大，覆盖牙面的1/2甚至更多，质地中等，颜色呈灰白色。采集病史时，应重点询问的病史，除外 A．牙龈自动出血史 B．癫史 C．偏侧咀嚼史 D．家族史 E．近来全身身体状况 正确答案：C

14．男，30岁，有夜磨牙症史及紧咬牙史多年，最有可能出现的临床体征是 A．牙齿松动 B．牙齿过度磨耗 C．肌肉抽搐 D．失眠 E．张口受限 正确答案：B

15．男，45岁，临床：牙周袋探诊深度3~5mm，下牙2112松动度2度，且前伸牙合时有早接触，诊断为成人牙周炎。最佳治疗方案是 A．OHI 洁治 调合 刮治 结扎固定 B．OHI 调合 洁治 刮治 结扎固定 C．OHI 调合 结扎固定 洁治 刮治 D．OHI洁治 刮治 调合 结扎固定 E．OHI 结扎固定 调合 洁治 刮治 正确答案：D

16．一名33岁的牙周病患者来牙周科就诊，临床检查：多数牙齿松动、移位，牙周袋探诊深度为5~8mm.若要确诊为快速进展型牙周炎，诊断前哪一项辅助检查最为重要 A．X线片 B．全身身体状况 C．调查家族史 D．牙合检查来源：考试大 E．白细胞趋化功能 正确答案：A

17．一位20岁女性患者，诊断为青少年牙周炎，如果应用抗生素治疗，最佳选择是 A．四环素 B．甲硝唑 C．麦迪霉素 D．非甾体类抗炎药 E．牙周宁 正确答案：A

18．女性，38岁，患成人牙周炎，经医生治疗后，右下7根分叉处探诊仍出血。请分析疗效不好的可能原因，除外 A．治疗不彻底 B．有釉

突 C . 与邻牙接触不良 D . 合关系 E . 口腔卫生不良 正确答案 : C

19 . 一患者 , 左上后牙颊侧牙龈肿胀 , 疼痛2天。检查 : 左上56间颊侧呈卵圆形膨隆 , 波动感 ( ) , 若诊断为急性牙周脓肿 , 与牙槽脓肿鉴别诊断 , 下面哪一项不正确 A . 合创伤 B . 牙周袋的存在 C . 是否有龈下牙石 D . X线片 E . 叩痛程度 正确答案 : A

20 . 患者经龈上洁治、龈下刮治后 , 下面哪一种情况通常不考虑合调整 A . 严重错合 B . 翻瓣术术前 C . 截根术术前 D . 钢丝结扎术后 E . 咀嚼时 , 牙齿疼痛或不适感 正确答案 : A

21 . 牙周基础治疗完成2个月后 , 磨牙区袋深仍5mm左右 , 附着龈较宽 , 牙槽骨水平吸收 , 无异常骨形态 , 进行牙周手术治疗的最佳选择为 A . 根向复位瓣术 B . 改良Windman手术 C . 牙冠延长术 D . 植骨术 E . 冠向复位瓣术 正确答案 : B

22 . 女 , 36岁 . 下牙321123拥挤 , 前牙深覆盖 , 仅左上1明显唇向移位。请分析此病人病理性移位的原因 , 最不可能的是 A . 牙槽骨的吸收 B . 合关系 C . 合力的改变 D . 牙周炎症 E . 吐舌习惯 正确答案 : E

23 . 女性 , 40岁 , 右下6颊侧根分叉病变2度仅在该牙颊侧中央有一窄而深达8mm的牙周袋 , 牙髓活力测无反应 , 指出下面的治疗方案 , 哪一项不正确 A . 牙周基础治疗 B . 同时牙髓治疗 C . 局部用药 D . 牙髓治疗后立即牙周手术 E . 调合 正确答案 : D

24 . 一名患者 , 诊断为逆行性牙髓炎 , 决定其预后的最关键因素为 A . 患者的年龄 B . 患者的全身状况 C . 牙髓治疗的疗效 D . 口腔卫生习惯 E . 牙周的病变程度及预后 正确答案 : E

25 . 一名牙周病患者 , 戴心脏起搏器 , 禁止做下列哪一项治疗 A . 龈下刮治术 B . 超声洁牙术 C . 袋壁搔刮术 D . 调合 E . 钢丝结扎术 正确答案 : B

26 . 女性 , 34岁 , 左上1舌侧一局限深

袋7mm此时医生选择用超声洁牙机的龈下刮治头刮治此处。请指出哪一项不是超声龈下刮治的优势 A . 对细小牙石的敏感性高 B . 冲洗作用 C . 操作方便 D . 工作头狭长而细 E . 损伤小 正确答案：A

27 . 一名患者，诊断为慢性牙周炎牙周基础治疗后，上前牙袋深7~8mm，袋底超过膜龈联合。决定手术方案时，下列哪一项手术最不适合此患者 A . 牙周翻瓣术 B . 牙龈切除术 C . 牙周翻瓣术十骨成形 D . 引导性组织再生术 E . 植骨术 正确答案：B

28 . 女，14岁，主诉：刷牙牙龈出血1年余，有时牙龈肿痛。确诊为青少年牙周炎之前，需做哪些检查，除外 A . 牙周袋深度 B . 附着水平 C . X线片 D . 测体温 E . 咬合关系 正确答案：D

29 . 女性，34岁，检查：左上1舌侧一局限深袋7mm，颊侧龈缘下2mm处可见一窦道口，但颊侧未及深袋，牙髓活力正常，试分析此牙周袋最可能属于哪类牙周袋 A . 龈袋 B . 复合牙周袋 C . 复杂牙周袋 D . 单面袋 E . 骨上袋 正确答案：C

30 . 男性，28岁，主诉：牙龈肿痛3天。检查：右侧上下颌颊、舌侧牙龈乳头呈鲜红色，有的龈乳头内有脓肿形成，未及深牙周袋。最有可能的诊断是 A . 急性坏死性龈炎 B . 多发性牙周脓肿 C . 多发性牙龈脓肿 D . 增生性龈炎 E . 边缘性龈炎 正确答案：C

31 . 男性，35岁，右下5近中颊有一局限性深袋5mm，X线片：根周膜增宽，近中角形吸收，请指出哪一项最可能是它牙周袋形成的炎症扩延途径 A . 血管周围结缔组织 牙槽骨 骨髓腔 牙周韧带 B . 牙龈 牙周韧带 骨髓腔 C . 血管周围结缔组织 牙周韧带 牙槽骨 骨髓腔 D . 血管周围结缔组织 牙周韧带 骨髓腔 牙槽骨 E . 牙龈 骨髓腔 牙周韧带 正确答案：B

32 . 一位实习生在对一患者进行牙周检查时，探得右上7近中

舌侧位点探诊深度为5mm，但教师检查发现该位点的实际探诊深度为7mm.下列因素影响此学生探诊的准确性，除外 A . 龈下牙石来源：考试大 B . 探诊的角度 C . 探测的位置 D . 探诊的力量 E . 探针头的直径 正确答案：E

33 . 女性，16岁，诊断为青少年牙周炎，X线片：双侧下第一磨牙近远中牙槽骨垂直吸收根长的1 / 2，下列哪一项体征最不可能出现 A . 牙齿松动 度 ~ 度 B . 牙龈退缩 C . 牙龈呈实质性增生 D . 合创伤 E . 根分叉病变 正确答案：C

34 . 女性，16岁，X线片：双侧下第一磨牙牙槽骨呈弧形吸收至根长的1 / 2，双侧上第一磨牙及下切牙的牙槽骨吸收根长的1 / 3，余牙未见明显牙槽骨吸收。请问此患者最有可能的诊断是 A . 慢性牙周炎 B . 青少年牙周炎 C . 快速进展型牙周炎 D . 青春期龈炎 E . 青春前期牙周炎 正确答案：B

35 . 女性，29岁，检查：全口牙龈呈鲜红色，牙龈肥大，覆盖至牙面的1 / 3，有自动出血倾向。为鉴别诊断，应重点询问的病史，除外 A . 全身情况 B . 妊娠史 C . 月经情况 D . 口腔卫生习惯 E . 是否长期服用避孕药 正确答案：D

36 . 女，6岁，主诉：全口牙龈增生2年余，一侧已妨碍咀嚼。诊断为牙龈纤维瘤病，请问关于此病人有可能出现的体征哪一项不正确 A . 牙齿可发生移位 B . 不影响萌牙 百考试题(www . Examda . com) C . 牙龈可盖住全部牙冠 D . 增生牙龈呈结节状 E . 增生波及膜龈联合 正确答案：B

37 . 男，25岁，体健，全口牙龈双侧呈实质性牙龈增生，覆盖牙冠的1 / 2 ~ 3 / 4，5个月前曾住院做过一次全口牙龈切除术，但现又复发，此病人的最可能诊断是 A . 药物性牙龈增生 B . 青春期龈炎 C . 牙龈纤维瘤病 D . 牙龈瘤 E . 边缘性龈炎 正确答案：C

38 . 男，22岁，主诉：咬苹果时牙龈出

血半年，检查：全口PD：2~3mm，如果此病人诊断为边缘性龈炎，应必须。符合哪一项检查 A．PDlt.3mm，X线片：未见牙槽嵴顶吸收。此患者最可能的诊断是 A．边缘性龈炎 B．慢性牙周炎 C．青春期龈炎 D．坏死性龈炎 E．青少年牙周炎 正确答案：A

41．女性，24岁，主诉：用牙线清洁牙齿时牙龈有时出血。检查：牙龈乳头轻度充血、水肿，PD：2~3mm，未及附着丧失。此患者最可能的诊断是 A．边缘性龈炎 B．牙间乳头炎 C．青春期龈炎 D．青少年牙周炎 E．急性坏死性龈炎 正确答案：A

42．男，16岁，主诉：刷牙牙龈出血3个月余，早晨起床时口角及枕巾有时有血迹。检查：上前牙牙龈边缘及牙龈乳头充血、发亮、呈鲜红色，有少量菌斑堆积，上唇稍短。试分析造成此患者牙龈炎症较重的原因，除外 A．口呼吸 B．开唇露齿 C．舔唇习惯 D．激素水平 E．菌斑 正确答案：C

43．男性，30岁，有5年吸烟史。主诉：牙龈自动出血伴牙龈疼痛、口臭3天，未发热。检查：牙石，龈缘呈虫蚀状，表面覆盖坏死伪膜，易于擦去。最可能的诊断是 A．牙间乳头炎 B．边缘性龈炎 C．急性坏死性龈炎 D．疱疹性龈口炎 E．快速进展型牙周炎 正确答案：C

44．男性，25岁，主诉：牙龈自动出血伴牙龈疼痛3天。如果诊断为急性多发性牙龈脓肿，最不可能的临床发现是 A．龈乳头内有脓肿形成 B．脓肿波及颊、舌侧 C．可有叩诊敏感 D．脓肿可波及附着龈 E．可及局部淋巴结肿大 正确答案：D

45．男，25岁，检查：下前牙及右下后牙龈乳头变平，表面覆盖一层伪膜，探诊出血、疼痛。最可能的诊断是 A．急性坏死性龈炎 B．快速进展型牙周炎 C．牙间乳头炎 D．疱疹性龈口炎 E．急性多发性龈脓肿 正确答案：A

46．男性，24岁，主诉：

牙龈自动出血伴牙龈疼痛5天。如果诊断为急性坏死性龈炎，此患者最可能的临床发现 A．某个龈乳头水肿，呈鲜红色 B．牙龈出血及牙齿松动 C．龈乳头变平，表面覆盖一层伪膜 D．牙龈乳头出现溃疡 来源：考试大 E．在唇、颊、牙龈均可出现溃疡 正确答案：C

47．男性，25岁，主诉：牙龈肿胀、疼痛3天，检查：多数龈乳头有脓肿形成。如果诊断为急性多发性牙龈脓肿，最佳治疗方案 A．牙周基础治疗（洁治、刮治） B．基础治疗含漱液 C．基础治疗中西医疗法 D．基础治疗休息 E．基础治疗 抗生素 维生素C 正确答案：C

48．女，26岁，左下后牙突然自发痛1天。临床检查：未见龋及深牙周袋，X线：牙体未见异常。如果诊断为急性牙间乳头炎，口腔检查最可能的发现是 A．牙龈乳头出现坏死 B．牙龈表面溃疡 C．牙齿中度磨耗 D．牙间乳头红肿 E．龈裂 正确答案：D

49．女，24岁，右下后牙突然自发痛1天。检查：局部牙龈乳头红肿、触痛。如果诊断为急性牙间乳头炎，最佳治疗措施 A．牙髓治疗 B．牙周一牙髓联合治疗 C．调合 D．除去牙石，3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>冲洗 E．洁治 抗生素 正确答案：D

50．女，21岁，戴固定矫正器半年余，近5个月觉刷牙牙龈出血，龈乳头呈球状增生，质地松软，袋深2~4mm，未及釉牙骨质界。最可能的诊断是 A．青春期龈炎 B．牙龈纤维瘤病 C．增生性龈炎 D．边缘性龈炎 E．快速进展型牙周炎 正确答案：C

51．女，23岁，主诉：前牙牙龈红肿肥大1年余。有口呼吸的习惯，体健。此患者最可能的诊断是 A．青春期龈炎 B．增生性龈炎 C．青少年牙周炎 D．边缘性龈炎 E．药物性牙龈增生 正确答案：B

52．女，24岁，主诉：前牙牙龈肿大1年余。检查：前牙PD：3~4mm。如果此患者诊断为肥大性龈炎，通

过下列哪项检查与早期牙周炎鉴别 A . 牙龈的炎症程度 B . 现病史 C . 牙周袋的存在 D . 细菌学检查 E . 有无附着丧失  
正确答案 : E 53 . 男 , 23岁 , 主诉 : 前牙牙龈逐渐肿大2年余。如果此患者诊断为肥大性龈炎 , 下列哪一项不是它的病因因素 A . 细菌 B . 口呼吸 C . 不良充填体 D . 长期服苯妥英钠 E . 错合 正确答案 : D 54 . 女 , 16岁 , 前牙唇侧牙间乳头呈球状突起 , 呈鲜红色、松软光亮 , 可见少量菌斑沉积。若诊断为青春期龈炎 , 此患者应与哪些疾病做鉴别诊断 , 除外 A . 增生性龈炎 B . 青少年牙周炎 C . 牙龈纤维瘤病 D . 药物性牙龈增生 E . 妊娠期龈炎 正确答案 : C 55 . 女 , 15岁 , 前牙唇侧牙间乳头呈球状突起 , 松软光亮 , 局部刺激物不明显。试述扩大了龈组织对局部刺激物反应的最可能的原因 A . 夜磨牙 B . 吐舌习惯 C . 激素水平 D . 上唇短 E . 刷牙不认真 正确答案 : C 56 . 女 , 16岁 , 前牙唇侧牙间乳头呈球状突起 , 松软光亮。若此患者诊断为青春期龈炎 , 下列哪项治疗措施不正确 A . 改正不良习惯 B . 尽早做牙龈切除术 C . 教正确的刷牙方法 D . 牙周基础治疗 E . 定期复查 百考试题(www . Examda . com) 正确答案 : B 57 . 女 , 28岁 , 主诉 : 近半年全口牙龈逐渐肿大 , 刷牙易出血 , 有自动出血史 , 但可自行停止。在诊断前 , 最应注意询问的病史 , 除外 A . 妊娠史 B . 近来全身状况 C . 食物嵌塞史 D . 长期服用药物史 E . 饮食习惯 正确答案 : C 58 . 女 , 27岁 , 主诉 : 刷牙牙龈出血3个月余 , 伴有自动出血。在诊断前 , 最应注意询问的病史 , 除外 A . 服大仑丁药物史 B . 血液病史 C . 牙龈肿痛史 D . 艾滋病史 E . 妊娠史 正确答案 : A 59 . 女 , 30岁 , 主诉 : 近半年牙龈逐渐肿大 , 刷牙易出血 , 有自动出血史。若此患者诊断为

妊娠期龈炎，临床检查最可能的发现 A．牙龈乳头出现溃疡  
来源：考试大 B．牙龈疼痛，出血，有恶臭味 C．牙龈出血  
及牙齿松动 D．化脓，恶臭味和牙龈疼痛 E．牙龈鲜红色，  
表面呈分叶状 正确答案：E 60．女，25岁，主诉：下前牙唇  
侧牙龈长一肿瘤3个月。若诊断为妊娠瘤，下列治疗方案哪一  
项不正确 A．牙周基础治疗 B．去除不良修复体 C．手术期可  
选择妊娠的第4～6个月 D．尽量在分娩后切除 E．若妊娠瘤表  
面感染，应及时配合抗生素治疗 正确答案：E 61．女，29岁  
，体健。主诉：近3个月刷牙牙龈易出血，且咀嚼较硬食物时  
牙龈出血。应做如下检查，除外 A．口腔卫生状况 B．合力  
测定 C．牙龈炎症 D．附着丧失 E．探诊深度 正确答案：B 62  
．女，29岁，主诉：近3个月刷牙牙龈易出血，且咀嚼较硬食  
物时牙龈出血。若此患者诊断为妊娠期龈炎，临床检查最可  
能的发现是 A．牙龈乳头变平 B．牙龈疼痛，出血，有恶臭  
味 C．牙龈出血及牙齿松动 D．牙龈增生肥大，覆盖至牙面  
的2/3 E．龈缘及乳头鲜红色，松软发亮 正确答案：E 63．男  
，58岁，高血压病史多年，临床：全口牙龈边缘及牙龈乳头  
充血水肿，牙龈增生覆盖牙冠的1/2，下前牙出现松动移位  
。最有可能的诊断是 A．肥大性龈炎 B．牙龈纤维瘤病 C．快  
速进展型牙周炎 D．药物性牙龈增生 E．牙间乳头炎 正确答  
案：D 64．女，57岁，临床：牙龈边缘及牙龈乳头充血水肿  
，全口牙龈增生覆盖牙冠的1/3～1/2，下前牙出现松动移  
位。为确定诊断最应重点询问 A．家族史 B．绝经史 C．高血  
压史 D．口腔卫生史 E．口呼吸习惯 正确答案：C 65．女  
，55岁，高血压史多年。临床：牙龈边缘及牙龈乳头充血水  
肿，全口牙龈增生覆盖牙冠的1/3～1/2.此患者若诊断为药

物性牙龈增生，哪一药物与之最密切 A．大仑丁类 B．环孢菌素 C．硝基吡啶 D．消心痛百考试题论坛 E．地血平 正确答案：C

66．女，55岁，高血压史多年，诊断为药物性牙龈增生。该患者的治疗方案，哪一项不正确 A．牙周基础治疗 B．全身应用抗生素 C．口腔卫生宣教 D．最好换另一类降压药 E．必要时，可作牙周手术 正确答案：B

67．女，27岁，检查：全口牙龈增生覆盖牙冠的 $1/3 \sim 1/2$ 。诊断为药物性牙龈增生，关于牙龈增生的原因，哪一项不正确 A．成纤维细胞的分裂活动增加 B．无活性胶原溶解酶分泌增加 C．与原有牙龈炎症无关 D．合成大于降解 E．合成胶原的能力增强 正确答案：C

68．女，27岁，检查：全口牙龈增生覆盖牙冠的 $1/2$ 。重点询问的病史，除外 A．妊娠史 B．急性肝炎病史 C．癫痫史 D．家族史 E．目前身体状况 正确答案：B

69．男，33岁，主诉：近1~2年来自觉全口牙齿松动，咀嚼力量减弱，前牙出现移位。最可能的初步印象为 A．慢性牙周炎 B．快速进展型牙周炎 C．青少年牙周炎 D．急性多发性牙周脓肿 E．急性坏死性龈炎 正确答案：B

70．女，33岁，主诉：近1~2年来自觉全口多数牙齿松动，咀嚼力量减弱。若诊断为快速进展型牙周炎，临床检查最有可能的发现是 A．多数牙移位 B．多发的牙周脓肿 C．磨牙根分叉病变3度 D．多数牙牙槽骨呈中重度吸收 E．多数牙牙龈退缩明显 正确答案：D

71．女，28岁，X线片：牙槽骨破坏以及上下左右6及左右下12重，但其他牙齿的牙槽骨也出现破坏，程度不一。请问此患者的最可能的诊断为 A．慢性牙周炎 B．快速进展型牙周炎 C．青少年牙周炎 D．急性坏死性龈炎 E．多发性牙周脓肿 正确答案：B

72．男，34岁，主诉：近1~2年来自觉全口牙齿松

动，咀嚼力量减弱。若此患者诊断为快速进展型牙周炎，造成此患者牙齿松动的最主要原因是 A．牙龈炎症 B．牙槽骨的吸收 C．原发性牙合创伤 D．继发性牙合创伤 E．牙周韧带炎症 正确答案：B

73．男，45岁，经有经验的医生系统治疗后6周，患者复查，检查：全口牙龈边缘仍轻度充血、水肿。试问影响其治疗愈后的因素，首先应考虑 A．口腔卫生水平 B．有无釉突 C．牙颈部楔状缺损 D．合创伤 E．不良修复体 正确答案：A

74．男，45岁，经有经验的医生治疗后，右上6颊侧根分叉处仍探诊出血。影响根分叉病变治疗愈后的原因，除外 A．根分叉入口过小 B．釉突 C．患者未用牙线 D．去除菌斑牙石不彻底 E．多数磨牙根分叉距釉牙骨质界较近 正确答案：C

75．一患者，主诉：右上后牙牙龈肿痛2天。检查：右上6颊侧牙龈卵圆形肿胀，波动感（ ） PD：7mm，探袋内溢脓，电活力测正常。最可能的诊断是 A．急性牙槽脓肿 B．急性多发性牙周脓肿 C．逆行性牙髓炎 D．急性牙周脓肿 E．根分叉病变 正确答案：D

76．一患者，检查：右上6颊侧牙龈卵圆形肿胀，波动感（ ），袋深8mm。若此患者诊断为急性牙周脓肿，以下为首诊应选择的治疗措施，哪一项不正确 A．深刮除净龈下牙石 B．切开引流 C．局部牙周袋内用药 D．调磨明显早接触点 E．全身抗生素支持疗法 正确答案：A

77．一位患者，牙周治疗1周后，右下磨牙颊侧牙龈突然肿起，若诊断为急性牙周脓肿，请分析此患者脓肿形成的原因，除外 A．治疗前是复杂袋 B．洁治或刮治时，将牙石推向深部 C．机体抵抗力下降 D．刮治术不彻底 E．牙髓治疗不彻底 正确答案：E

78．一位38岁的男患者，左上67间牙龈反复肿胀半年，经常食物嵌塞，应做的进一步检查，除了 A．邻面龋

B. 两牙接触关系 C. 两牙牙冠外形 D. 对牙合牙齿情况 E. 活体组织检查来源：考试大 正确答案：E

79. 一患者主诉左下后牙食物嵌塞，临床：左下78间食物嵌塞，左下8正位且无对合牙，请分析引起食物嵌塞最可能的原因是 A. 外溢道消失 B. 对合牙尖过于高陡 C. 两牙边缘嵴高度不一致 D. 上颌牙下垂 E. 牙间乳头退缩 正确答案：C

80. 一患者主诉左下后牙食物嵌塞，临床：左下78间食物嵌塞，左下8正位且无对牙合牙，且过长。此病人解决食物嵌塞的最佳方法是 A. 扩展外展隙 B. 调磨相邻两牙边缘嵴 C. 调磨磨耗小平面 D. 调磨对牙合牙尖 E. 拔除左下8 正确答案：E

81. 男，42岁，牙龈出血疼痛3天，口臭，检查：个别牙龈乳头有灰白色的坏死物。若诊断为坏死性龈炎，患者可出现如下体征，除外 A. 口腔呈腐败性口臭 B. 低热 C. 身体抵抗力下降 D. 颌下淋巴结肿大 E. 末梢血出现原幼细胞 正确答案：E

82. 男性，38岁。全身不适，食欲减退2天，伴上唇左侧唇红粘膜及周围皮肤起疱、结痂来诊。在考虑诊断时下列哪种疾病最不可能 A. 疱疹性口炎 B. 唇疱疹 C. 带状疱疹 D. 疱疹性咽峡炎 E. 慢性唇炎 正确答案：E

83. 患者，男性，20岁。因吸毒感染艾滋病，HIV（ ）。检查发现下前牙牙龈缘及颊部粘膜表面有溃疡形成，表面覆灰白色污秽假膜，牙龈乳头消失，口臭明显。应诊断为 A. 快速进展性牙周炎 B. 坏疽性口炎 C. 白血病 D. 剥脱性龈炎 E. 粒细胞减少症 正确答案：B

84. 女婴，2个月，口腔粘膜出现白色凝乳状的斑点及斑块可擦拭，基底粘膜发红、啼哭、哺乳困难，应怀疑为 A. 鹅口疮 B. 复发性口腔溃疡 C. 疱疹性龈口炎 D. 球菌性口炎 E. 克隆病 正确答案：A

85. 男性，60岁，患糖尿病10年。近2周来口干

、口渴加重，双侧口角裂口、出血，进食有明显烧灼感。检查双侧口角发红伴有皲裂形成，上下颌为全口义齿修复，义齿承托区粘膜发红，其范围与义齿相吻合。义齿表面涂片镜检可见大量菌丝。临床治疗应选哪种方法最有效 A．每日用3%～5%碳酸氢钠液含漱 B．保持口腔卫生，注意餐具的隔离消毒 C．改换或重衬义齿 D．口含制霉菌素或达克宁霜局部涂擦 E．补充铁、维生素B12及叶酸 正确答案：D

86．女性，46岁，口腔溃疡反复发作3年，间隔1～2个月，多在经前出现，每次1～3个不等，主要位于下唇和舌等部位，疼痛明显，7～10天左右愈合。要想达到理想的治疗效果，宜采取 A．口腔局部对症治疗 B．全身使用抗生素 C．补充多种维生素 D．口服雌激素 E．注射转移因子 正确答案：D

87．男性，60岁，鼻咽癌术后放疗，放疗两次后口腔粘膜大面积溃烂，疼痛明显。该患者可能的诊断为 A．白色念珠菌感染 B．放射性口腔炎 C．急性感染性口炎 D．过敏性口炎 E．接触性口炎 正确答案：B

88．男性，68岁，口腔溃烂3个月来诊，体检发现双颊粘膜大面积糜烂，有边缘打展现象，糜烂面表面被覆较厚的灰白伪膜，呈斑片状。经脱落细胞学检查拟诊为天疱疮。查血常规及分类白细胞 $1.6 \times 10^9 / L$ ，中性82%。本病例最切合实际的首选治疗为 A．1%～2%普鲁卡因液含漱止痛 B．局部应用皮质类固醇激素类软膏 C．全身给予抗生素，口腔局部用0.25%金霉素含漱液 D．口含制霉菌素，口腔局部用碱性漱口水 E．保持口腔卫生，去除刺激因素 正确答案：C

89．男性，8岁，因牙龈及口腔粘膜坏死溃烂1周，伴高烧10天来诊。经检查初步诊断为坏死性龈口炎。口腔局部治疗时，以下哪种药物不适用 A．3%过氧化

氢 B . 1%龙胆紫 C . 10%硝酸银 D . 牙周塞制剂 E . 养阴生肌散或冰硼散 正确答案：C 90 . 女性，22岁，因全口牙龈肿痛，伴自发性出血来诊。检查患者口腔卫生差，牙石软垢度，口臭明显。全口牙龈红肿左右下12唇侧牙龈乳头呈刀削状，表面有灰白色伪膜被覆，去除坏死膜，基底为易出血的新鲜创面。该病例拟诊断为 A . 急性感染性口炎 B . 放射性口腔炎 C . 坏死性龈口炎 D . 疱疹性龈口炎 E . 白血病

www.Examda.CoM 正确答案：C 91 . 男性，36岁，口内多处溃疡，疼痛不能进食来诊。检查双颊及舌粘膜，可见小米粒的溃疡十余个，散在分布，周围粘膜广泛充血红肿。以往曾有多次类似发作病史。该患者应诊断为 A . 疱疹性咽峡炎 B . 疱疹性龈口炎 C . 白塞病 D . 带状疱疹 E . 疱疹样口疮

正确答案：E 92 . 男性，24岁，口腔溃疡反复发作5年，加重半年。查：舌缘左右侧各可见两块约1 . 0 ~ 1 . 2cm大小的溃疡，边缘不整，表面有灰白色的膜。下唇内侧粘膜有条形白色瘢痕。该患者拟诊断为“腺周口疮”，临床应注意与下列哪种疾病相鉴别 A . 多形红斑 B . 扁平苔藓 C . 褥疮性溃疡 D . 单纯疱疹 E . 白血病

正确答案：C 93 . 女性，65岁，上下颌全口义齿修复，近2周感下颌舌侧粘膜疼痛，不能带义齿来诊。查下颌舌侧与口底粘膜移行处可见一条形增生组织，边缘外翻，表面有少许伪膜，疼痛明显。此患者拟诊断为 A . Riga病 B . Bednar口疮 C . 增殖性病损 D . 粘膜血疱 E . 癌性溃疡

正确答案：C 94 . 患儿，男性，8个月，舌系带溃烂1月，查左右下 萌出，边缘锐利，舌系带处可见1 . 0cm × 0 . 8cm大小的溃疡，溃疡增殖，边缘高起外翻，表面有灰白色伪膜，触较硬。此患儿可能诊断为 A . Riga病 B . Bednar口疮 C . 腺周口

疮 D . 褥疮性溃疡 E . 鹅口疮 正确答案 : A 95 . 女性 , 24岁 , 因左侧上颌后牙牙髓炎在外院行塑化治疗 , 治疗后相对应的左颊粘膜破溃 , 疼痛明显来诊 , 该患者临床印象为化学性灼伤 , 最有效的治疗措施为 A . 局部涂 2 . 5% 碘甘油 B . 0 . 1% 利凡诺含漱 , 局部涂抗菌药膜或药膏 C . 用大量的 0 . 9% 生理盐水或清水冲洗 D . 观察 , 不用药 E . 口服抗生素 正确答案 : B 96 . 男性 , 45岁 . 因头颈部肿瘤放疗 , 放疗结束后 , 感口干、进食刺激痛来诊 . 查 : 口腔粘膜干 , 唾液粘稠 , 双颊、上下唇内侧粘膜可见弥散不规则红斑 , 舌背丝状乳头广泛萎缩 , 粘膜充血发红明显 . 其诊断首先应考虑为 A . 放射性口腔炎 B . 继发白念感染 C . 口干综合征 D . 维生素 B2 缺乏 E . 糜烂型扁平苔藓 正确答案 : B 百考试题(www . Examda . com) 97 . 女性 , 39岁 , 因口腔粘膜反复起疱 9 个多月就诊 , 起疱与进食无关 , 疱损可破溃形成溃疡 . 临床检查可见上下牙唇颊侧牙龈粘膜有多个水疱或糜烂面 , 探针无法探入疱损周围粘膜下 , 左侧舌腭弓粘膜有瘢痕挛缩 , 患者不曾用过任何抗免疫治疗 . 关于该疱损的说法下列哪项可能是错误的 A . 应取活检确诊 B . 直接免疫荧光检查有助于诊断 C . 还应检查皮肤和眼结膜 D . 水疱位于上皮下 E . 水疱位于上皮内 正确答案 : E 98 . 男性 , 40岁 , 发现右颊粘膜白色斑块 1 个月 , 临床检查除右颊孤立白色斑块外未发现其他病损 . 你认为下列哪项提供的信息不足以作为本病例的发病因素 A . 吸烟习惯 B . 病损局部机械刺激因素 C . 白色念珠菌感染 D . 唾液 pH 值偏高 E . 嗜酒习惯 正确答案 : D 99 . 女性患者 , 46岁 , 1 年来口腔粘膜反复起疱、破溃 , 此起彼伏 , 伴有疼痛 . 检查发现 : 口腔粘膜广泛云雾状水肿 , 有多处鲜红糜烂面 , 周

围有灰白色疱膜，撕取疱膜时可同时揭去周围正常粘膜。脱落细胞涂片可见Tzanck细胞。治疗本病开始时应给予 A．强的松100～120mg/d B．强的松60～80mg/d C．强的松40～60mg/d D．强的松30mg/d E．强的松10mg/d 正确答案：B

100．女性，52岁，左上后牙龈反复起疱，探针不能探入疱周粘膜下。可发现抗基底膜区抗体的方法是 A．直接免疫荧光检查 B．间接免疫荧光检查 C．组织病理学检查 D．脱落细胞培养 E．血清免疫球蛋白测定 正确答案：A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)