口腔内科学习题及答案(A1型题4)执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E5_8F_A3_ E8 85 94 E5 86 85 E7 c22 507557.htm 一、A1型题:每一道 考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方 框涂黑。 1. 第一恒磨牙萌出特点中哪项不正确 A. 萌出最早 ,家长不认识 B . 牙龈缘位置稳定不发生改变 C . 釉质耐酸 性低 D. 远中咬合面可长时间被牙龈覆盖容易发炎 E. 初萌 时牙根未发育完成 正确答案:B2.第一恒磨牙龋蚀特征中哪 项是错误的 A. 下颌患龋率高于上颌 B. 邻面比牙合面易患 龋 C. 龋蚀进行速度快 D. 萌出时就可患龋 E. 乳牙患龋率高 恒牙容易患龋 正确答案:B3. 吮指不良习惯中哪项是错误的 A. 吮拇指发生率较高 B. 2岁以前多为生理性吸吮 C. 所吮 手指不同对咬合的影响不同 D. 吮指习惯随年龄增长减少 E . 吸吮拇指可引起反合 正确答案: E4. 下列乳牙龋病特点中 哪项是错误的 A.发病率高,发病时间早,多发 B.容易发 展成牙髓炎 C. 容易发生环状龋 D. 不能形成修复性牙本质 E . 自觉症状不明显, 易忽略 正确答案: D5. 乳磨牙制备银汞 充填洞型时,哪项不正确A.合面窝沟龋局限时可制备独立 圆形洞形, 不必扩展 B. 单面洞邻壁过薄可制备 类洞形 C . 为避免意外穿髓不必强调底平 D . 洞要有一定深度,线角 要圆钝 E. 乳牙不用恢复咬合高度和接触点 正确答案:E来源 :考试大6.乳磨牙邻面龋备洞时,哪项是错误的A.鸠尾岬 宽度是颊舌尖间距离的1/3B.轴壁应与水平面垂直C.轴髓 壁与合髓壁的线角应圆钝 D. 龈壁应水平 E. 龋蚀接近合面

时可不做台阶 正确答案:B7. 预成冠的缺点是 A. 预成冠可 以恢复牙齿解剖形态 B. 可以恢复咀嚼功能 C. 牙颈部不容 易密合 D. 釉质发育不全、外伤牙可用预成冠修复 E. 预成 冠可做间隙保持器的固位体 正确答案:C8. 复合树脂修复乳 前牙缺损时,哪个步骤是错误的A.去净腐质氧化锌丁香油 糊剂垫底 B.40%磷酸酸蚀90秒 C.用水冲洗,吹干牙面30秒 D.涂布薄层粘结剂,3秒后吹干E.分层放置复合树脂材料 恢复外形 正确答案:A 9 . 下列哪项不是乳牙牙髓炎特点 A . 上下乳磨牙好发 B.炎症扩展迅速 C.去腐未净露髓表明牙 髓有慢性炎症 D. 牙髓感染可导致根分歧处骨吸收 E. 牙髓 炎可伴有根吸收 正确答案:A 10. 乳牙牙髓治疗中哪项是正 确的 A. 乳牙根管充填可用糊剂加牙胶尖 B. 牙髓坏疽可以 做活髓切断 C. 牙根开始吸收时不能做活髓切断 D. 乳牙不 能做氢氧化钙活髓切断 E.乳牙保存活髓也很重要 正确答案 : E"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载 。详细请访问 www.100test.com