

复习指导：阿维A酯使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_507700.htm

药理：药效学 确切机理尚不清楚，可使银屑病患者损害的鳞屑、红斑和厚度减少，组织学上示表皮分化正常，角质层厚度减少，表皮和真皮炎症消退。药动学 本品从小肠吸收，与牛奶或高脂肪饮食同服比空腹吸收为多，高浓度储存在脂肪组织（特别在肝和皮下组织中）。99%以上本品与血浆蛋白（主要为脂蛋白）结合。以一次25mg，每日1~4次慢性治疗患者中，达峰浓度为2~6小时，血药浓度峰值为102~389ng/ml。主要从胆道排泄，亦可从肾排出。适应症：适用于治疗银屑病（严重顽固病例，包括红皮病型和泛发脓疱型）、严重顽固口腔扁平苔藓、严重顽固难治角化疾患（如鱼鳞癣样皮肤病、先天性鱼鳞癣样红皮病、板层状鱼鳞病和其他鱼鳞病）、毛囊角化病、掌跖角化病、毛发红糠疹、掌跖脓瘤病。用法用量：成人剂量：开始按体重每日口服0.75—1mg/kg，红皮病型银屑病可每日口服0.25mg/kg，每周递增每日0.25mg/kg，直至获得最满意效果。维持量为每日0.50.75mg/kg，通常在8—16周后采用。由于本品吸收、代谢在人体内有差异，故本品剂量需个体化。最高限量成人为每天1.5mg/kg。[制剂与规格]阿维A酯胶囊（1）10mg（2）25mg 禁用慎用：（1）交叉过敏反应：对异维A酸、维A酸、维生素A衍生物、对羟苯甲酸酯类和乳糖不耐受者，对本品亦不耐受。（2）孕妇禁服，因本品能致畸，曾发现在停药2年后妊娠仍发生畸胎。（3）对育龄妇女治疗前2周进行妊娠试验，确保未有妊娠，在治疗期和治疗

后无限期内需采取有效的避孕方法，否则禁用。（4）对哺乳和将来哺乳的妇女禁用。（5）小儿慎用，除非其他疗法都不奏效。曾在小儿中报道肢体骨间韧带和肌腱骨化，有2例X光摄片提示骨骺过早闭合。（6）下列情况使用需权衡利弊：心血管疾病或有家族史者；糖尿病或有家族史者；肝病或有家族史者；高甘油三酯血症，或有家族史者；大量饮酒者，肥胖症。妊娠及哺乳期妇女禁用，过敏者禁用。给药说明：（1）孕妇禁服，接受治疗患者需计划以后不再生育。治疗开始前1月，治疗期和治疗后数年内需避孕。哺乳或将来计划哺乳者禁服；小儿慎用，除非采取其他治疗方法无效，一旦怀孕应告知继续怀孕的危险性。（2）治疗患者即使停药后亦不能供血。（3）避免同时使用维生素A。（4）不准饮酒或含酒精饮料。百考试题网站整理（5）不准驾驶、操作机器或危险作业，因可突然发生晚间视力减退。治疗期和治疗后数周内可发生眼干燥，对接触镜片的耐受性降低，需滴润滑剂。（6）避免日光曝晒，不使用太阳灯。（7）倘发生口干，采用无糖饮料或唾液代用品。（8）治疗开始时银屑病损害可加剧，需连续服药2或3个月，才见显效。（1）在给每日45mg/kg高剂量雄小鼠中，经80周后发现血管肿瘤发生率增高。（2）在12例男性银屑病患者以每日75mg治疗1月，继以每日50mg治疗2月，对精子产生无影响。（3）老年人中应用未发现特殊问题。（4）治疗期间需作以下随访。血脂测定，治疗前空腹测定，治疗期隔1—2周测定1次共48周，饮酒后需经36小时才测定；血糖，有或疑有糖尿病者测定；骨X线摄片，包括踝、膝和骨盆，因长期或多疗程治疗可发生骨肥厚；眼底检查，如出现大脑假

性肿瘤的早期症状（如重度或持续头痛、恶心、呕吐、视力模糊等），检查有否乳头水肿；血清ALT、AST、LDH测定，治疗前、治疗期隔1—2周共1—2月，以后1—3月测1次。本品不影响维生素A的正常血浓度，但为防止维生素A的过量，仍应避免同时服用。不良反应：（1）出现在皮肤粘膜、肌肉骨骼、肝和中枢神经系统的症状类似高维生素A综合征。

（2）较常见的不良反应：骨或关节疼痛、压痛或僵直；上腹部或胃部绞痛或疼痛；眼睑异常（烧灼、发红、瘙痒、干燥、疼痛、压痛、泪溢等）；唇皸裂、鼻干燥；皮肤干燥、发红、脱屑、瘙痒、皮疹、对日光敏感性增加、头痛、对接触镜片敏感性增加；指尖、掌趾皮肤脱屑，头发稀薄；鼻衄，口渴和疲乏。（3）少见的不良反应：结膜、角膜、晶体、

眼外肌、眼压、瞳孔、玻璃体异常（视力模糊、复视或其他视力变化）；肝炎、头晕、口干、发热、恶心；甲松离、甲沟炎等。（4）罕见的不良反应：遗忘、焦虑、精神萎靡、

抑郁、齿龈出血或炎症、视网膜出血、虹膜炎、白内障、畏光，大脑假性肿瘤、耳感染。治疗初期会引起副作用，一般能耐受，减量可消失，过量会引起口干、唇炎及皸裂、粘膜干涸或发炎、口渴及流汗。少数出现可逆性脱发、皮肤变薄、

氨基转移酶及碱性磷酸酶短暂性升高，尤其患糖尿病、肥胖、酗酒、脂代谢不良者更易发生。长年用高剂量维持治疗，曾发现骨骼变化和良性颅内高血压。相互作用：（1）与

药用肥皂、清洁剂、痤疮制剂、含脱屑药制剂（如过氧苯甲酰、雷琐辛、水杨酸、硫磺、维A酸）、含乙醇制剂（如剃须后搽洗剂、收敛剂、芳香化妆品、剃须霜或洗剂、化妆品）

）、有强干燥作用的肥皂、药用肥皂合用，可加剧皮肤刺激

或干燥作用。（2）饮酒可发生高甘油三酯血症。（3）与牛奶和高脂肪食物同服可增加本品吸收。（4）与异维A酸、维A酸或维生素A同服，可加剧毒性作用。（5）与氨甲蝶呤或肝毒性药物共用，可增加肝毒性反应。（6）与光敏药物共服，可加剧光敏感作用。（7）与四环素共服可引起大脑假性肿瘤的潜能。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com