

药物分析：丁非洛尔药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/507/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_89\\_A9\\_E5\\_88\\_86\\_E6\\_c23\\_507105.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_507105.htm) 俗称: 药物简介

【药理】 阻断  $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$ 受体，无内在拟交感活性

【应用及用法】 用于高血压，口服，100mg/次，1日2次；某些人可用

至400mg/d

【注意】 (1) 除对心脏的  $\alpha_1$ 受体有

阻断作用外，对支气管及血管平滑肌的  $\alpha_2$ 受体亦有

阻断作用，可引起支气管痉挛及鼻粘膜微细血管收缩，故

忌用于哮喘及过敏性鼻炎病人。(2) 忌用于窦性心动过缓

、重度房室传导阻滞、心源性休克、低血压症病人。充血性

心力衰竭病人(继发于心动过速者除外)，须等心衰得到控

制后始可用本品。不宜与抑制心脏的麻醉药(如乙醚)合用

。(3) 有增加洋地黄毒性的作用，对已洋地黄化而心脏高

度扩大、心率又较不平稳的病人忌用。百考试题网站整理

(4) 不宜与单胺氧化酶抑制剂(如帕吉林)合用。(5) 本

品剂量的个体差异较大，宜从小到大试用，以选择适宜的剂

量。长期用药时不可突然停药。(6) 副作用可见乏力、嗜

睡、头晕、失眠、恶心、腹胀、皮疹、晕厥、低血压、心动

过缓等，须注意。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)