

药物分析：醋丁洛尔药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_507114.htm 俗称:醋丁酰心安

，acecor，monitan，neptal 药物简介 本品可选择性地阻断 β_1 受体，即具有心脏选择作用，也具有一定的内在交感活性和膜稳定性。作用与普萘洛尔相似，但强度仅及 $1/2$ 。口服本品可自胃肠吸收 70% ，其经肝的首过效应较大（ 30% ），故绝对生物利用度约 40% ；口服后 2 小时达血药浓度峰值；在日剂量为 $200 \sim 400\text{mg}$ ，其血药浓度与剂量成正比，剂量更大时则否。与血浆蛋白结合率低，但与红细胞结合率为 50% 。它可分布于全身，但不易通过血脑屏障；它可通过胎盘，也可出现于乳中。约 70% 在肝内被代谢成仍具药理活性的二醋洛尔（diacefolol），原形药及代谢物均有肝肠循环，并均由肾排出，本品的 $t_{1/2}$ 为 $3 \sim 4$ 小时，其代谢物的 $t_{1/2}$ 为 $8 \sim 13$ 小时。在老年人，其 $t_{1/2}$ 延长；在肾功能低下者，其 $t_{1/2}$ 可延长至 32 小时。本品可用于高血压、心绞痛、心律失常等。百考试题网站整理 用于高血压时，口服，开始剂量为 $400\text{mg}/\text{日}$ ，于早餐时 1 次服下或于 1 日内分为两次服用，需要时可于 2 周后增加剂量至 $400\text{mg}/\text{次}$ ，1 日 2 次。用于心绞痛时，口服，剂量为 $400\text{mg}/\text{d}$ ，于早餐时 1 次服下或于 1 日内分为两次服用，可根据情况增量至 $300\text{mg}/\text{次}$ ，1 日 3 次。肾功能低下者宜减量，老年人 1 日剂量不宜超过 800mg 。亦可缓慢静注， $12.5 \sim 25\text{mg}/\text{次}$ ，24 小时内总量不得超过 $95 \sim 100\text{mg}$ 。一般不良反应同普萘洛尔。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com