

药物分析：珠氨噻醇药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/507/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_89\\_A9\\_E5\\_88\\_86\\_E6\\_c23\\_507299.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_507299.htm) 药物别名：英文名称

：Zuclopenthixol 说明：糖衣片：每片含二盐酸盐11.83mg（相当于碱10mg）。片剂。每片含二盐酸盐29.58mg（相当于碱25mg）。膜包衣片：每片含二盐酸盐2.38、11.90或29.75mg（相当于碱2、10或25mg）。滴剂：1ml（20滴）含二盐酸盐23.8mg〔相当于碱20mg，含酒精14.2%（V/V）〕20ml装。注射液（供静注或肌注用）：每支1ml，含29.58mg二盐酸盐（相当于碱25mg）。功用作用：本品为氟哌噻吨的顺式异构体，具有抗哌醋甲酯引起的刻板症作用，并有抗阿扑吗啡的作用，前者作用比氟哌噻吨弱而比氟丙嗪强20倍，后者作用与氟哌啶醇相同。本品能抑制条件回避反应与僵住症，比氟丙嗪强10倍。抗胆碱作用弱，而抗组胺作用强。口服后可从胃肠道吸收，3~6小时达高峰浓度，绝对生物利用度为25%，在肝、肺、肠、肾中浓度高，在大脑中浓度低。在肝脏代谢，主要由粪便排出，少量自肾脏排出。血浆 $t_{1/2}$ 为20小时。本品适用于治疗有焦虑和幻觉症状的精神病、类妄想狂-幻觉型精神分裂症、青春期痴呆、躁狂及焦虑周期性精神病；精神因素引起的不安、兴奋、精神错乱，脑萎缩过程，外伤后的精神病、震颤谵妄等。本品较适用于老年病人。用法用量：口服：糖衣片，住院病人一般剂量为每日75~150mg，门诊病人每日10~40mg。2mg膜包衣片，每日服用2~6mg，必要时可增加剂量。10mg膜包衣片，某些急、慢性精神病患者每日服20~70mg；治疗精神因素引起的激动、不安和错乱

，每日10～40mg。25mg膜包衣片，治疗急性精神分裂症和躁狂症，每日服25～50mg，在服用2～3日后可根据需要增加到每日75mg或更多，治疗慢性病人的维持剂量为每日25～50mg。滴剂：某些急、慢性精神病人，每日服20～75mg，（20～75滴）；治疗精神因素引起的激动、不安和错乱，根据病情严重程度，每日服2～40mg（2～40滴）。滴剂可用水稀释或与食品和饮料混合后服用。各种膜包衣片或滴剂的每日剂量可在晚上1次服用或分3次服。注意事项：（1）本品偶见锥体外系反应、运动困难、静坐不能、血循环障碍、唾液和汗腺分泌失调、胃肠功能障碍、尿潴留、造血功能障碍、胆汁淤积、癫痫发作、角膜或晶体混浊、心脏传导障碍、闭经、溢乳等。用药开始阶段易出现疲倦。（2）本品应禁用于急性酒精中毒、催眠药镇痛药和精神药物中毒、循环性休克及昏迷、对噻嗪、噻吨类过敏的病人，妊娠初期慎用。（3）开始治疗时，应定期检查心电图、血象、肝功能，长期应用，至少每6～12个月检查1次。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)