

依那普利拉使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E4_BE_9D_E9_82_A3_E6_99_AE_E5_c22_508018.htm

药理：本品为依那普利的活性型，是强力的血管紧张素转换酶抑制剂。口服无效，仅供静脉注射用。能扩张高血压患者周围血管、降低血压。充血性心力衰竭者静注本品后冠状血管扩张，平均动脉压下降，肺毛细血管楔嵌压降低，心肌耗氧量减少，心指数及心搏量增加。百考试题网站整理 适应症：适用于治疗急进型或高血压危象需迅速降压者及稳定型心力衰竭者，尤适用于处于昏迷状态及因各种原因不能口服给药的患者。本品不降低脑血流，故亦适用于因血压下降可能使脑供血不足带来危险的患者。用法用量：静注，高血压病患者每次10~40mg，约30min内效果达最明显；剂量超过40mg，作用不再增强，但维持时间延长。也可用1.25~5mg，每6h给药1次方式。在充血性心力衰竭者一般每次2.5~5mg，每日1次。当病情控制后一般均改为用依那普利口服继续治疗。本品每10mg约相当于依那普利20mg。[剂型与规格]注射剂：10mg/2ml. 禁用慎用：严重肾功能减退者宜减量慎用。低血压患者禁用。相互作用：与呋塞米同用可增强本品降压作用及延长作用时间。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com