

苯丙酸诺龙注射液使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/508/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8B\\_AF\\_E4\\_B8\\_99\\_E9\\_85\\_B8\\_E8\\_c22\\_508024.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E8_8B_AF_E4_B8_99_E9_85_B8_E8_c22_508024.htm)

理化特性：本品为淡黄色的澄明油状液体。药理作用：本品为蛋白同化激素。既能增加由氨基酸合成蛋白质，又能抑制氨基酸分解生成尿素，纠正负氮平衡。同化作用较甲基睾酮强大而持久，雄激素作用较弱。可使钙、磷、钾、硫和肌酸蓄积，促进骨骼肌发育，躯体骨骼生长，体重增加。『药代动力学』本品肌注100mg后，1-2天血药浓度达峰值，作用可维持1-2周。适应症：女性晚期乳腺癌姑息性治疗；伴有蛋白分解的消耗性疾病的的治疗。用法用量：深部肌肉注射：成人常用量 女性转移性乳腺癌姑息性治疗：百考试题网站整理 每周25~100mg，肌肉注射。一般须持续至12周，如有必要，治疗结束4周后，可进行第二个疗程。蛋白大量分解的严重消耗性疾病，如严重烧伤、慢性腹泻、大手术后等。每周25~50mg，肌肉注射，同时须摄入充足的热量和蛋白质。注意事项：心脏、肝、肾患者、癌骨转移患者、糖尿病、前列腺肥大患者慎用。『禁忌症』高血压、孕妇及前列腺癌患者禁用。『儿童用药』儿童长期应用，可严重影响生长、可致早熟，应慎用。『妊娠及哺乳期妇女用药』孕妇及哺乳妇女禁用百考试题网站整理『老年患者用药』易引起水钠潴留，高血钾症，应慎用。不良反应：1.本品有轻微男性化作用，妇女使用后，可能会长胡须，粉刺增多，多毛症，声音变粗，阴蒂肥大、闭经或月经紊乱等反应。2.男性：长期使用可能会有痤疮、精子减少、精液减少。3.肝脏：GOP、GTP上升、黄疸

。 4.消化系统：恶心、呕吐、消化不良、腹泻。 5.电解质：水钠潴留。 6.皮肤：皮疹、颜面潮红。 相互作用：（1）可增强抗凝血药香豆素、华法令等的抗凝作用；（2）与皮质激素合用，可使血糖升高。 储藏：遮光，密闭保存。 剂型规格：（1）1ml：10mg（2）1ml：25mg"100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)