

复习指导：苯丙哌林使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_508026.htm

药理：本品为非麻醉性镇咳药，其作用具有双重镇咳性，即： 阻断肺 - 胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射； 直接对咳嗽中枢产生抑制。其镇咳作用较可待因强2~4倍，起效快，不抑制呼吸。本品对平滑肌的作用类似罂粟碱，但临床上不引起胆道和十二指肠痉挛，不至于造成便秘，无成瘾性，未发现耐药性。

[药理作用]本品为一非麻醉性镇咳药，具有降低咳嗽中枢兴奋性、阻断肺及胸膜系的牵张感受器产生的肺迷走神经反射作用，从而抑制咳嗽冲动的传导，产生镇咳作用。同时，它对咳嗽中枢也有直接抑制作用。此外，本品尚具有罂粟碱样的平滑肌解痉作用。它对呼吸无抑制作用，也不引起便秘。

适应症：适用于各种原因引起的刺激性干咳。

用法用量：口服成人一次20-40mg，一日3次。本品粉末对口腔可引起麻木感，服用片剂时勿嚼碎。

[制剂与规格]磷酸苯丙哌林片20mg 口服，一次20mg，一日3次，或遵医嘱。

百考试题网站整理 **[用法及用量]**口服，每次20~40mg，每日3次。儿童酌情减量。本品对口腔粘膜有麻醉作用，故应整片吞服，切勿嚼碎，以免引起口腔麻木。

[剂型与规格]片剂：20mg / 片。

禁用慎用：（1）动物试验虽未发现致畸作用，但本品在妊娠期间的用药安全性尚未确定，所以孕妇慎用。（2）对本品呈过敏反应者禁用。

给药说明：本品粉末对口腔可引起麻木感，服用片剂时勿嚼碎。

不良反应：偶有口干、头晕、嗜睡、食欲不振等。偶有口干，食欲不振，烧心，乏力，头晕

，药疹。偶见有轻度口干、嗜睡、乏力、头昏、胃部烧灼感、食欲不振、药疹等。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com